AtriCure®

CE 2797

AtriCLip™ LAA Exclusion System with preloaded Gillinow-Cosgrove® Clip

(LAA815, LAA840, LAA845, LAA850)
(AC415S, AC415AS, AC415ASL)
(AC425S, AC425AS, AC425ASL, AC425SO)

AtriClip LAA Exclusion System
ILLUSTRATION AND NOMENCLATURE

1 Handle
2 Actuation Lever
3 Suture Cutting Zone
4 Nose Cone with Clip size identifier
5 Malleable Shaft
6 Articulation Cinch
7 Gillinow–Cosgrove Clip
8 Suture Anchors
9 Deployment Loop
10 Articulated Deployment Loop

1 Plunger
2 Handle
3 Suture Cutting Zone
4 Shaft
5 Gillinow–Cosgrove Clip
6 Suture Anchors
7 Deployment Loop
8 Malleable Zone 1

Flach AtriClip handles are a different malleable shape.
The entire length of the AtriClip Easy device's shaft is malleable.
The AtriClip Standard device's malleable zone is denoted by a set of dots on the shaft near the deployment loop. It is only intended for minor adjustments in the lateral (left/right) plane.
The entire length of the AtriClip FLEX device's shaft is malleable. It is intended for adjustments up to 45° in all planes

en | **INSTRUCTIONS FOR USE** | **ENGLISH**

AtriClip™ LAA Exclusion System with preloaded Gillinow-Cosgrove® Clip

DESCRIPTION

The AtriClip LAA Exclusion System contains the Gillinow-Cosgrove LAA Clip (Clip) for open occlusion of the heart's left atrial appendage (LAA). The Clip is pre-loaded on a disposable Clip applicator. The AtriClip LAA Exclusion System with preloaded Gillinow-Cosgrove Clip does not contain natural rubber latex components.

⚠ CAUTION: BEFORE USING PRODUCT READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY

IMPORTANT!

This booklet is designed to assist in using this product. It is not a reference to surgical techniques.

INDICATION FOR USE

The AtriClip LAA Exclusion System is indicated for open occlusion of the heart's left atrial appendage.

CONTRAINDICATIONS

1. Do not use this device as a contraceptive tubal occlusion device.
2. Do not use this device if the patient has a known allergy to Nitinol (nickel titanium alloy).

There are no additional risks and/or side effects associated with the implantation of the Clip other than those typically associated with cardiac surgical procedures.

⚠ WARNINGS

1. Do not attempt to reposition or remove the Clip after deployment. This may result in tissue damage or tearing.
2. Do not use this device, which is the applicator of the surgeon, would not be able to tolerate conventional suture materials or conventional closure techniques (such as surgical staples).

⚠ CAUTION: BEFORE USING PRODUCT READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY

1. Carefully evaluate Clip position, tissue thickness, and tissue width prior to Clip deployment. To determine appropriate Clip size, refer to the Gillinow-Cosgrove Selection Guide Instructions for Use. Failure to correctly size or deploy the Clip may result in: tissue trauma, dehiscence, tissue tearing, displacement and/or lack of desired hemostasis.
2. Do not use on a LAA less than 20mm in width and 1.0mm wall thickness.
3. Do not use on a LAA greater than 50mm when tissue is compressed.
4. Do not use this device if the patient has sensitivity to Nickel (nickel titanium alloy).

⚠ PRECAUTIONS

1. Read all instructions carefully for the AtriClip LAA Exclusion System. Failure to properly follow instructions may result in improper functioning of the device.
2. Use of the device should be limited to properly trained and qualified medical personnel.
3. Note that variations in specific procedures may occur due to individual physician preferences.
4. Do not drop or toss the device as this may induce damage to the device. If the device is dropped, do not use. Replace with a new device.
5. If the sterile package is damaged and/or the sterile barrier is breached, discard device and do NOT use.
6. DO NOT RESTERILIZE. The AtriClip LAA Exclusion System is provided STERILE and is intended for SINGLE use only. Resterilization may cause loss of function or injury to patient.
7. Carefully consider any pre-surgical treatment the patient may have undergone and it corresponding selection of Clip size. Preoperative radiotherapy may result in changes to tissue. These changes may, for example, cause the tissue thickness to exceed the indicated range for the selected Clip size.
8. Do not modify this instrument. Use of a modified device may result in improper instrument function. AtriCure, Inc. makes no claim or representation as to the performance characteristics of this product if any modification has been made to the AtriClip LAA Exclusion System.
9. Do not kink or excessively bend the shaft as this may affect device performance.
10. Excavate thrombus from the LAA prior to Clip application as with other conventional LAA occlusion surgical techniques. Evaluating for the presence of thrombus should be done per the surgeon's discretion and standard of care.
11. Position and deploy Clip in a manner that provides clear visualization of tissues being accounted. Poor visualization may result in suboptimal placement.
12. Take care to minimize manipulation of the LAA and Clip after Clip deployment.
13. It is recommended that the Clip be deployed in a dry field.
14. Do not use the Clip in temperatures below 2°C. Application of the Clip in temperatures below 20°C may affect device performance.

INSTRUCTIONS FOR USE

Surgeon judgment, with the assistance of the Gillinow-Cosgrove Selection Guide, should determine what size Clip to apply.

CLIP SELECTION

1. Using the Gillinow-Cosgrove Selection Guide, to determine correct selection of the Gillinow-Cosgrove LAA Clip. Clip sizes are located on the device package.

2. Using sterile technique, remove the AtriClip LAA Exclusion System from its packaging.
3. The malleable shaft of the AtriClip LAA Exclusion System may be reshaped to aid in accessing the LAA. Apply gentle pressure to shape the device shaft as required for anatomical variations.

4. Gently position the AtriClip at the base of the LAA.

5. Position the Clip in a manner that provides clear visualization of all tissues being accessed.
6. While the Clip is still affixed to the Deployment Device, carefully ensure the surrounding tissues are not caught in the Clip, and that the Clip is placed correctly.
7. If the Clip is not placed correctly, gently open the Clip and reposition as needed.

DEPLOYMENT

11. After the Clip is positioned correctly, release the actuation lever or plunger allowing the Clip to close.
12. Deploy the Clip by manually cutting the suture at the designated cutting zone on the Lever or handle.

13. Providing counter pressure on the Clip, carefully remove the deployment loop from the LAA as shown below leaving the Clip and attachment suture behind.

15. Cut the deployment device after use. Follow local governing ordinances and recycling plans regarding disposal or recycling of device components.

RETURN OF USED PRODUCT

If for any reason this product must be returned to AtriCure, Inc., a return goods authorization (RGA) number is required from AtriCure, Inc., prior to shipping. If the product has been in contact with blood or body fluids, it must be thoroughly cleaned and disinfected before packing. It should be shipped in either the original carton or an equivalent carton, to prevent damage during shipment, and it should be properly labeled with an RGA number and an indication of the Behavioral nature of the contents of shipment.
Instructions for cleaning and materials, including appropriate shipping containers, proper labeling, and an RGA number may be obtained from AtriCure, Inc.

DISCLAIMER STATEMENTS

Users assume responsibility for approving the acceptable condition of this product before it is used, and for ensuring that the product is only used in the manner described in these instructions for use, including, but not limited to, ensuring that the product is not re-used. Under no circumstances will AtriCure, Inc. be responsible for any incidental, special or consequential loss, damage, or expense, which is the result of the distribution misuse or re-use of this product, including any loss, damage, or expense which is related to personal injury or damage to property.

HANDLING INFORMATION: GILLINOW–COSGROVE LAA CLIP

MRI SAFETY INFORMATION

⚠ MR CONDITIONAL
Non-clinical testing demonstrated that the AD01 (AtriCure Occlusion Device) clip is MR Conditional. A patient with this device can be scanned safely in an MR system immediately after placement under the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5 Tesla and 3 Tesla, only
- Maximum spatial gradient magnetic field of 4,000 gauss/cm (40 T/m) (extrapolated) or less
- Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 4 W/kg for 15 minutes of scanning (i.e., per pulse sequence) in the First Level Controlled Operating Mode of operation for the MR system
- Under the scan conditions defined for the AD01 Clip it is expected to produce a maximum temperature rise of 2.9°C after 15 minutes of continuous scanning (i.e., per pulse sequence)

ARTIFACT INFORMATION

In non-clinical testing, the image artifact caused by the AD01 Clip extends approximately 10 mm from the AD01 Clip when imaged using a gradient echo pulse sequence and a 3 Tesla MR system.

EXPLANATION OF SYMBOLS ON PACKAGE LABELING

Refer to the outer package label to see which symbols apply to this product.

bg | **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА** | **БЪЛГАРСКИ**

Система за изключване AtriClip™ LAA с предварително заредена щипка Gillinow-Cosgrove®

ОПИСАНИЕ

Системата за изключване AtriClip LAA съдържа щипката Gillinow-Cosgrove LAA (щипка) за отворена оклузия на ушето на левото предсърдие (left atrial appendage; LAA) на сърцето. Щипката е предварително заредена на апликатор за одноразова употреба, произведен за хирургична употреба. Системата за изключване AtriClip LAA с предварително заредена щипка Gillinow-Cosgrove не съдържа компоненти от естествен латекс на каучук.

Система за изключване на LAA AtriClip АНАТОМИЯ И НОМЕНКЛАТУРА

LAA815, LAA840, LAA845, LAA850 – AtriClip Standard
AC415S, AC415AS, AC415ASL – AtriClip FLEX™
AC425S, AC425AS, AC425ASL, AC425SO – AtriClip FLEX™

1 Дръжка
2 Работен лост
3 Зона за отрязване на конци
4 Обтекател с идентификатор за размера на щипката
5 Гъвкав стеб
6 Фиксатор на ставата
7 Щипка Gillinow–Cosgrove
8 Закотвяне на конци
9 Фиксираща примка
10 Шарнирна фиксираща примка

1 Бутало
2 Дръжка
3 Зона за отрязване на конци
4 Стеб
5 Щипка Gillinow–Cosgrove
6 Закотвяне на конци
7 Фиксираща примка
8 Гъвкава частI

Плоската дръжка на гъвкава на устройство AtriClip FLEX е с гъвкава. За е предназначена за корекции в ъгъла (ляво/дясно).
Цялата дължина на стеба на устройство AtriClip FLEX е с гъвкава. За е предназначена за корекции до 45° във всички равнини.

⚠ ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗЦЯЛО СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО!

Тази брошура е предназначена да подпомогне използването на този продукт. Тя не е справочен документ за хирургични техники.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Системата за изключване AtriClip LAA е показана за отворена оклузия на ушето на левото предсърдие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Не използвайте тази устройство като устройство за оклузия на тръби с контрацептивна цел.
2. Не използвайте тази устройство, ако пациентът има известна алергия към нитинол (никелов титанова сплав).

Няма допълнителни рискове и/или странични ефекти, свързани с имплантирането на щипката, освен онези, които са обичайно свързани със сърдечно-съдовите хирургични процедури.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не се опитвайте да променяте позицията или да сваляте щипката след поставяне. Това може да доведе до нараняване или разкъсване на тъкани.
2. Използвайте тази устройство само по предписателно.
3. Не използвайте твърдо, гъвкаво, остро, инвазивно на хирурга, или по-твърдо конвенционални шевни материали или конвенционални техники на затваряне (като например с хирургически скоби).

Внимателно прочетете инструкциите за щипката, добавена към системата за изключване на тъканта, преди да поставите щипката. За да определите подходящия размер на щипката, направете справка с инструкциите за употреба на селекционния инструмент Gillinow-Cosgrove. Неправилният размер или не/правилно разгъване на щипката може да доведе до тъканна травма, дехисценция, разкъсване на тъканта, изместване и/или липса на желаната хемостаза.

1. Не използвайте при LAA с ширина под 20 mm и дебелина на стената под 1,0 mm.
2. Не използвайте при LAA с ширина над 50 mm при компресирана тъкан.
3. Не използвайте тази устройство, ако пациентът има чувствителност към нитинол (никелов титанова сплав).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Прочетете внимателно всички инструкции за системата за изключване AtriClip LAA. Неспазването на указанията може да доведе до неправилно функциониране на устройството.
2. Устройството трябва да се използва само от квалифицирани обучени и професионални медицински персонал.
3. Имайте предвид, че са възможни разлики в отделни процедури поради индивидуалните техники на лекарите и анатомията на пациента.
4. Не изпускайте и не хвърляйте устройството. Ако щипката е паднала, не я използвайте. Ако е необходимо устройство, то е с по-голяма дължина. Заменете с нова щипка.
5. Ако стерилната опаковка е повредена и/или стерилната бариера е нарушена, изхвърлете устройството и не го използвайте.
6. НЕ СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ ПОВТОРНО. Системата за изключване AtriClip LAA е доставена СТЕРИЛНА и е предназначена само за ЕДНОКРАТНА употреба. Повторната стерилизация може да причини загуба на функционалност/увреждане на пациента.
7. Отчетете внимателно отчетете предоперативната терапия, която пациентът може да е преминал, и в евентуален предстоящ хирургия на съответния размер щипка. Предоперативната лъчетерапия може да доведе до тъканни промени. Например, тези промени в материята на тъканите за тези промени допаметна на тъканта да надвишава показания диапазон за избрания размер на щипката.
8. Не променяйте конструкцията на инструмента. Използването на модифицирано устройство може да доведе до неправилна работа на инструмента. AtriCure, Inc. не носи/не твърди/не е свързана по отношение на работните характеристики на този продукт, ако е бъдещ, е бъдещ, е бъдещ е бъдещ е бъдещ

AtriCure®

CE 2797



⚠ **Ettevaatust!** Ärge võtke varre painutamisel kinni paigaldusaasast, sest see võib seadet kahjustada. Painutamiseks avaldage vajutage varrele ettevaatlikult mõlema pöidlaga. Varre liigne painutamine või murdmine võib halvendada seadme toimivust. Ärge püüdke paigaldusaasa keerata, kuna see võib seadet kahjustada.

4. Avage ja sulgege klamber ettevaatlikult kolvi või käepidemel oleva aktiveerimishoova abil kontrollimaks, kas seade toimib korrektselt.

⚠ **Ettevaatust!** Ärge avage ja sulgege klambrit kolvi või aktiveerimishoovaga enne paigaldamist rohkem kui kolm korda.

Otsatäituri liigend – mudelitel LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 ja LAAØ50.



5. AtriClip LAA välistamissüsteemi paigaldusaasa saab käega keerata varre suhtes 0° (sirge – tarnimisasend) kuni ±90° nurga alla, et hõlbustada Gillinov-Cosgrove'i LAA klambri paigaldamist, võttes arvesse patsiendi anatoomia eripära.

Klambri kohale asetamine

6. Viige AtriClip LAA välistamissüsteem soovitud lahutamistasapinnale.
7. Avage klamber ettevaatlikult, tõmmates aktiveerimishooba tahapoole või vajutades kolbi alla.

MÄRKUS. Klambri saab avatud asendisse fikseerida seadme käepidemel oleva lukustusmehhanismi abil. Lukk rakendub hoova tagasitõmbamisel ja selle vabastamiseks tuleb hooba ettevaatlikult vasakule nihutada. Mudelitel LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 ja LAAØ50.

MÄRKUS. Klambri avatud asendisse fikseerimiseks tuleb kolbi alla vajutada, kuni kostab klõps, ja seejärel vajutamine lõpetada. Luku vabastamiseks ja klambri sulgemiseks vajutage kolb lõpuni alla ja laske aeglaselt üles, kuni klamber sulgub. Mudelitel ACH135, ACH140, ACH145 ja ACH150.

8. Viige klambriaplikaator koos eellaaditud klambriga vasaku koja kõrva otsa juurde nii, et klambri otstes olevad aasad on suunatud vasaku koja kõrvast-st eemale.



9. Paigutage klamber ettevaatlikult vasaku koja kõrva allosale.

10. Tagage klambri kohale asetamise ajal, et kõik seotud koed oleksid selgelt näha.
11. Jätke klamber veel paigaldusseadme külge ning veenduge, et ümbritsevad struktuurid ei takista klambri liikumist, klamber ei vigasta neid ja on õiges asendis.
12. Kui klamber ei ole õiges asendis, avage see ettevaatlikult ja korrigeerige asendit vajaduse kohaselt.

Paigaldamine

13. Kui klamber on õigesti kohale asetatud, vabastage aktiveerimishoob või kolb ja laske klambril sulguda.
14. Klambri paigaldamiseks lõigake haavaniit hooval või käepidemel selleks ette nähtud lõikekohas käsitsi läbi.



15. Klambrit paigal hoides eemaldage paigaldusaas ettevaatlikult vasaku koja kõrva pealt, nagu joonisel näidatud, jättes maha klambri ja kinnitusniidi.

⚠ **Ettevaatust!** Kui haavaniidid on läbi lõigatud, ei saa AtriClip LAA välistussüsteemi enam kasutada klambri asendi muutmiseks või selle eemaldamiseks.

16. Kui klamber on paigaldatud, eemaldage kinnitusniidid neid ükshaaval tõmmates ja samal ajal klambrit paigal hoides vastavalt kirurgi erialasele äranägemisele. Ärge lõigake klambrit.



17. Visake kasutatud paigaldusseade ära. Järgige seadme osade kõrvaldamisel või ringlussevõtul kohalike eeskirjade ja jäätmehoolduskavade nõudeid.

KASUTATUD TOOTE TAGASTAMINE

Kui mistahes põhjusel tekib vajadus toode ettevõttele AtriCure, Inc. tagastada, tuleb enne toote saatmist saada ettevõttelt AtriCure, Inc. kauba tagastamise loa (RGA) number.

Kui toode on kokku puutunud vere või kehavedelikega, tuleb see enne pakendamist põhjalikult puhastada ja desinfitseerida. Transpordikahjustuste vältimiseks tuleks see saata originaalpakendis
või sellega samaväärses pakendis, millele on nõuetekohaselt märgitud RGA number ja teave, et tegemist on bioloogiliselt ohtlikku materjali sisaldava saadetisega.

Ettevõttelt AtriCure, Inc. on võimalik saada juhiseid puhastamise ja kasutatavate materjalide, sh sobivate saatmispakendite, korrektse märgistamise ja RGA numbri kasutamise kohta.

LAHTIÜTLUSED

Kasutajad vastutavad selle eest, et kontrollida enne toote kasutamist selle seisukorra vastuvõetavust ning tagada toote kasutamine ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, mis hõlmab muu hulgas toote korduva kasutamise välistamist. AtriCure, Inc. ei vastuta ühelgi juhul mis tahes ettenägematu, erilise või kaudse kaotuse, kahju või kulu eest, mis on tingitud toote teadlikust vaär- või korduskasutamisest, sealhulgas igasugune tervisekahjustuse või varakahjuga seotud kaotus, kahju või kulu.

TEAVE KÄSITSEMISE KOHTA: Gillinov-Cosgrove'i LAA klamber

MRT-ohutuse teave

⚠ **MR-ohutu**

Mittekliiniliseid katsetused on näidanud, et AOD1 (Annular Occlusion Device) klamber on MR-ohutu. Selle seadmega patsiendi skannimine MR-süsteemis on ohutu vahetult pärast seadme paigaldamist, kui süsteem vastab järgmistele tingimustele:

- staatiline magnetväli ainult 1,5 T või 3 T
- magnetvälja maksimaalne ruumiline gradient 4000 G/cm (40 T/m)(ekstrapoleeritud) või vähem
- MR-süsteemi kohta teatatud maksimaalne kogu keha keskmistatud erineelduvuskiirus (SAR) 15-minutilise skannimise korral (impulsitsükli kohta) esimese taseme kontrollitud režiimil
  on 4 W/kg
- AOD1 klambri suhtes määratletud skannimistingimustel on klambri temperatuuri eeldatav tõus 15 minuti möödumisel (impulsitsükli kohta) 2,9 °C.

Teave artefaktide kohta

Mittekliinilistes katsetustes ulatub AOD1 klambri põhjustatud pildiartefakt AOD1 klambrist ligikaudu 10 mm kaugusele, kui kasutatakse gradientkaja impulsitsüklit ja 3 T magnetväljaga MR-süsteemi.

fi	KÄYTTÖOHJEET	SUOMI

AtriClip® LAA -sulkujärjestelmä ja esiladattu Gillinov-Cosgrove®-klipsi

KUVAUS

AtriClip LAA -sulkujärjestelmä sisältää Gillinov-Cosgrove -klipsin (klipsi), jota käytetään sydämen vasemman sydänkorvakkeen avoimeen okkluusioon (LAA). Klipsi on esiladattu kertakäyttöiseen klipsin asettajaan. AtriClip LAA -sulkujärjestelmä esiladatulla Gillinov-Cosgrove-klipsillä ei sisällä luonnonkumilateksia sisältäviä komponentteja.

AtriClip LAA -sulkujärjestelmä KUVAT JA NIMIKKEISTÖ

LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45, LAAØ50 - AtriClip Pitkä[1]

1 Kahva	5 Taivutettava varsi	9 Asetussilmukka
2 Aktivointikahva	6 Nivelletty haarukka	10 Nivelletty asetussilmukka
3 Ompeleiden leikkausalue	7 Gillinov-Cosgrove-klipsi	
4 Nokkakartio, jossa klipsin koon tunnistin	8 Ompeleen kiinnittimet	

ACH135, ACH140, ACH145, ACH150 - AtriClip vakio[2]
ACH235, ACH240, ACH245, ACH250 FLEX - AtriClip FLEX[3]

1 Mäntä	4 Varsi	7 Asetussilmukka
2 Kahva	5 Gillinov-Cosgrove-klipsi	8 Muotoutuva alue†
3 Ompeleiden leikkausalue	6 Ompeleen kiinnittimet	

†Kussakin AtriClip-käsikappaleessa on erilainen muotoutuva alue.
[1]Pitkän AtriClip-laitteen varsi on muotoutuva koko pituudeltaan.
[2]Vakion AtriClip-laitteen muotoutuva alue on osoitettu sarjalla lovia varressa lähellä asetussilmukkaa. Se on tarkoitettu ainoastaan pieniin säätöihin lateraalisella (vasen/oikea) tasolla.
[3]AtriClip FLEX -laitteen varsi on muotoutuva koko pituudeltaan. Se on tarkoitettu 45° säätöihin kaikilla tasoilla.

⚠ **HUOMIO: ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA, LUE SEURAAVAT TIEDOT HUOLELLISESTI**

TÄRKEÄÄ!

Tämä opas avustaa tuotteen käytössä. Sitä ei ole tarkoitettu leikkaustekniikoiden ohjeeksi.

KÄYTTÖAIHE

AtriClip LAA -sulkujärjestelmää käytetään sydämen vasemman sydänkorvakkeen avoimeen okkluusioon.

VASTA-AIHEET

1. Älä käytä tätä laitetta ehkäisymenetelmänä munasolujen okkluusioon.
2. Älä käytä laitetta, jos potilaalla on tunnettu allergia nitinolille (nikkelititaaniseos).

Klipsin implantointiin ei liity muita riskejä ja/tai sivuvaikutuksia kuin ne, jotka tyypillisesti liittyvät sydänkirurgisiin toimenpiteisiin.

⚠ **HUOMIOITAVAA**

1. Älä yritä sijoittaa klipsiä tai poistaa sitä, kun se on laitettu paikalleen. Muutoin kudos voi vahingoittua tai repeytyä.
2. Käytä tätä laitetta ainoastaan käyttötarkoituksen mukaisesti.
3. Älä käytä kudoksessa, joka kirurgin näkemyksen mukaan ei siedä tavanomaisia ommelmateriaaleja tai tavanomaisia sulkemistekniikoita (kuten kirurginen nidonta).
4. Ennen kuin käytät klipsiä, arvioi huolellisesti klipsin asento, kudoksen paksuus ja kudoksen leveys. Määritä oikea klipsin koko käyttämällä ohjeena Gillinov-Cosgrove-valintaopasta. Väärän kokoinen tai väärin käytetty klipsi voi aiheuttaa: kudostrauman, avautumisen, kudoksen repeytymisen, siirtymän ja/tai halutun hemostaasin puutteen.
5. Älä käytä LAA:ssa, jonka leveys on alle 29 mm ja seinämän paksuus 1,0 mm.
6. Älä käytä yli 50 mm:n LAA:ssa, jos kudos on puristamaton.
7. Älä käytä laitetta, jos potilas on herkkä nikkelille (nikkelititaaniseos).

⚠ **VAROITUKSET**

1. Lue huolellisesti kaikki AtriClip LAA -sulkujärjestelmän ohjeet. Jos ohjeita ei noudateta asianmukaisesti, laite voi toimia väärin.
2. Ainoastaan asianmukaisesti koulutettu ja pätevä lääkintähenkilökunta saa käyttää laitetta.
3. Huomaa, että erityisissä toimenpiteissä voi esiintyä vaihteluita lääkäreiden yksittäisten tekniikoiden ja potilaan anatomian vuoksi.
4. Älä pudota tai visko laitetta, sillä se voi sen seurauksena vaurioitua. Jos laite putoaa, älä käytä sitä. Vaihda uuteen laitteeseen.
5. Jos steriili pakkaus on vahingoittunut ja/tai steriili este on rikkoutunut, hävitä laite ÄLÄKÄ KÄYTÄ SITÄ.
6. EI SAA STERILOIDA UUDELLEEN. AtriClip LAA -sulkujärjestelmä toimitetaan STERIILINÄ ja se on tarkoitettu ainoastaan YHDEN potilaan käyttöön. Uudelleen sterilointi voi johtaa toiminnan menetykseen tai potilasvahinkoon.
7. Arvioi huolellisesti potilaan mahdollisesti saama leikkausta edeltävä hoito ja valitse klipsin koko vastaavasti. Preoperatiivinen sädehoito voi aiheuttaa kudosmuutoksia. Tällaisten muutosten seurauksena esimerkiksi kudoksen paksuus voi ylittää valitulle klipsikoolle ilmoitetun kokoalueen.
8. Älä muokkaa tätä instrumenttia. Muokattu laite ei välttämättä toimi asianmukaisella tavalla. AtriCure, Inc. ei vakuuta tai kuvaa tämän tuotteen suorituskykyominaisuuksia, jos AtriClip LAA -sulkujärjestelmään on tehty muutoksia.
9. Älä kierrä tai taivuta vartta liikaa; laitteen suorituskyky voi vaarantua.
10. Tyhjennä verihyytymä LAA:sta ennen klipsin asettamista kuten muilla tavanomaisilla kirurgisilla LAA-okkluusiotekniikoilla. Verihyytymän olemassaolon arviointi on tehtävä kirurgin harkinnan ja standardin mukaisen hoidon mukaisesti.
11. Sijoita ja aseta klipsi siten, että saadaan riittävä näkyvyys kaikista käsitellyistä kudoksista. Huono näkyvyys voi johtaa epäoptimaaliseen sijoitukseen.
12. Kun klipsi on asetettu, rajoita LAA:n ja klipsin käsittely minimiin.
13. Suosituksena on, että klipsi käytetään kuivassa kentässä.
14. Älä käytä klipsiä alle 20 °C:n lämpötiloissa. Klipsin käyttö alle 20 °C:n lämpötiloissa voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn.

KÄYTTÖOHJEET

Käytettävän klipsin koko on määritettävä kirurgin arvion ja Gillinov-Cosgrove-valintaoppaan mukaan.

KLIPSIN VALINTA

1. Valitse oikea Gillinov-Cosgrove LAA-klipsi käyttämällä apuna Gillinov-Cosgrove-valintaohjainta. Klipsin koot on ilmoitettu laitteen pakkauksessa.

Klipsin koko	LAA:n kokoalue (LAA:n leveys)
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. Poista AtriClip LAA -sulkujärjestelmä pakkauksesta käyttämällä steriiliä tekniikkaa.
3. AtriClip LAA -sulkujärjestelmän muotoutuvaa vartta voidaan muotoilla LAA:n asettamisen avustamiseksi. Muotoile laitteen varsi anatomian edellyttämällä tavalla kevyesti painamalla.



⚠ ***Huomio:*** Älä tartu asetussilmukkaan varren taivuttamiseksi, koska se voi vahingoittaa laitetta. Suorita taivutus keskittämällä voima varovasti kummankin peukalon alle. Varren liiallinen taivuttaminen tai kiertyminen voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Älä yritä kiertää asetussilmukkaa, sillä laite voi vaurioitua.

4. Varmista klipsin oikea toiminta avaamalla ja sulkemalla se hellävaraisesti männän tai aktivointikahvan avulla.

⚠ ***Huomio:*** älä avaa ja sulje klipsiä yli 3 kertaa männällä tai aktivointikahvalla ennen asettamista.

Pääte-efektorin nivellys - Koskee malleja LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 ja LAAØ50.



5. AtriClip LAA -sulkujärjestelmän asetussilmukka voidaan niveltää manuaalisesti nollasta 0 ° (linjassa - kuten toimitettu) ±90° varteen nähden helpottamaan Gillinov-Cosgrove LAA-klipsin oikeassa asettamisessa potilaan anatomian anatomiset variaatiot huomioiden.

KLIPSIN ASETTAMINEN

6. Vie AtriClip LAA -sulkujärjestelmä kohdedissektion tasolle.
7. Avaa klipsi varovasti liikuttamalla aktivointikahvaa taaksepäin ja painamalla mäntää.

HUOMAUTUS: Klipsi voidaan lukita avoimeen asentoon laitteen kahvassa olevan lukitusominaisuuden avulla. Lukko lukittuu, kun kahva aktivoidaan, ja se voidaan vapauttaa siirtämällä kahvaa varovasti vasemmalle. Koskee malleja LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 ja LAAØ50.

HUOMAUTUS: Klipsi voidaan lukita auki-asentoon painamalla mäntää, kunnes kuuluu naksahdus, minkä jälkeen mäntä voidaan vapauttaa. Avaa ja sulje klipsi painamalla mäntä kokonaan ja vapauta hitaasti, kunnes klipsi sulkeutuu. Koskee malleja ACH135, ACH140, ACH145 ja ACH150.

8. Suuntaa klipsin asetin, jossa on esiasennettu klipsi LAA:n kärjessä, klipsin päissä oleviin silmukoihin poispäin LAA:sta.



9. Aseta klipsi varovasti LAA:n juureen.

10. Aseta klipsi niin, että saadaan riittävä näkyvyys kaikista käsitellyistä kudoksista.
11. Klipsi edelleen kiinnitettynä asettimeen varmista, että ympäröivät rakenteet eivät aiheuta häiriötä tai vahingoitu klipsistä ja että klipsi on asetettu oikein.
12. Jos klipsi ei asettunut oikein, avaa klipsi varovasti ja aseta se uudelleen tarpeen mukaan.

ASETTAMINEN

13. Kun klipsi on asetettu oikein, vapauta aktivointikahva tai mäntä ja anna klipsin sulkeutua.
14. Asenna klipsi leikkaamalla ompele manuaalisesti vivun tai kahvan määritetyllä leikkausalueella.



15. Kohdista klipsiin vastapainetta ja poista asetussilmukka varovasti LAA:sta alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla siten, että klipsi ja kiinnitysommel jäävät paikoilleen.

⚠ ***Huomio:*** kun ompeleet on leikattu manuaalisesti, AtriClip LAA -sulkujärjestelmää ei voida käyttää klipsin uudelleensijoittamiseen tai poistamiseen.

16. Kun klipsi on asennettu, poista kiinnitysompeleet vetämällä ne pois varovasti yksi kerrallaan pitämällä klipsiä vastaan kirurgin harkinnan mukaan. Älä leikkaa klipsin kangasta.



17. Hävitä asetin käytön jälkeen. Hävitä tai kierrätä laitteen komponentit noudattamalla paikallisia viranomaismääräyksiä ja kierrätysohjelmia.

KÄYTETYN TUOTTEEN PALAUTTAMINEN

Jos tämä tuote on jostakin syystä palautettava AtriCure, Inc. -yritykselle, AtriCure, Inc. -yritykseltä on hankittava tuotepalautusnumero (RGA) ennen lähettämistä.

Jos tuote on joutunut kosketuksiin veren tai kehon nesteiden kanssa, se on puhdistettava huolellisesti ja desinfioitava ennen pakkaamista. Kuljetusvaurioiden estämiseksi tuote tulee lähettää joko alkuperäispakkauksessa tai vastaavassa laatikossa, ja se on merkittävä asianmukaisesti RGA-numerolla ja ilmoituksella lähetyksen sisällön biologisesti vaarallisesta luonteesta.

Puhdistusohjeet ja materiaalit, mukaan lukien asianmukaiset kuljetusastiat, asianmukaiset merkinnät ja RGA-numero, ovat saatavissa AtriCure, Inc. -yritykseltä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

Käyttäjä vastaa tämän tuotteen hyväksyttävän tilan hyväksymisestä ennen sen käyttöä ja siitä, että tuotetta käytetään vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, mukaan lukien rajoittamatta varmistus siitä, että tuotetta ei käytetä uudelleen. AtriCure, Inc. ei ole missään tapauksessa vastuussa mahdollisista tahattomista, erityisistä tai seurauksellisista menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat tämän tuotteen tahallisesta väärinkäytöstä mukaan lukien henkilö- tai omaisuusvahinkoihin liittyvät menetykset, vahingot tai kustannukset.

KÄSITTELYÄ KOSKEVAA TIETOA: GILLINOV- COSGROVE LAA -KLIPSI

MRI-TURVALLISUUSTIEDOT

⚠ **MR-EHDOLLINEN**

Ei-kliiniset testit ovat osoittaneet, että AOD1 (Annular Occlusion Device) -klipsi on MR-ehdollinen. Potilas, jolla on tämä laite, voidaan kuvantaa turvallisesti MR-järjestelmässä heti asettamisen jälkeen seuraavissa olosuhteissa:

- Ainoastaan 1,5 Teslan ja 3 Teslan staattinen magneettikenttä
- Suurin mahdollinen avaruusgradientin magneettikenttä on 4 000 gaussia/cm (40-T / m) (ekstrapoloitu) tai sen alle
- Suurin ilmoitettu MR-järjestelmä, koko kehon keskimääräinen ominaisabsorptioaste (SAR) 4 W / kg 15 minuutin kuvauksessa (ts. pulssisekvenssiä kohden) MR-järjestelmän ensimmäisen tason hallitussa toimintatilassa
- AOD1-klipsille määritellyissä kuvausolosuhteissa odotetaan tuottavan enintään 2,9 °C:n lämpötilan nousun 15 minuutin jatkuvan kuvauksen jälkeen (ts. pulssisekvenssiä kohti)

ARTEFAKTITIEDOT

Ei-kliinisessä testauksessa AOD1-klipsin aiheuttama kuva-artefakti ulottuu noin 10 mm:n etäisyydelle AOD1-klipsistä, kun kuvataan käyttämällä gradienttikaikupulssisekvenssiä ja 3 Teslan MR-järjestelmää.

PAKKAUSETIKETIN SYMBOLIEN KUVAUS

Katso tuotekohtaiset symbolit ulkopakkauksen etiketistä.

fr	MODE D'EMPLOI	FRANÇAIS

Système d'exclusion LAA AtriClip® avec agrafe Gillinov-Cosgrove® préchargée

DESCRIPTION

Le système d'exclusion LAA AtriClip contient une agrafe LAA Gillinov-Cosgrove (agrafe) pour une occlusion ouverte de l'appendice auriculaire gauche (LAA). L'agrafe est préchargée sur un applicateur jetable. Le système d'exclusion LAA AtriClip avec l'agrafe Gillinov-Cosgrove ne contient aucun composant en caoutchouc naturel.

ILLUSTRATION ET NOMENCLATURE du système d'exclusion LAA AtriClip

LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45, LAAØ50 – AtriClip long[1]

1 Poignée	5 Tige malléable	9 Boucle de déploiement
2 Levier d'activation	6 Chape d'articulation	10 Boucle de déploiement articulée
3 Zone de coupe de suture	7 Agrafe Gillinov–Cosgrove	
4 Cône nasal avec identificateur de taille de l'agrafe	8 Ancrages de suture	

ACH135, ACH140, ACH145, ACH150 – AtriClip standard[2]
ACH235, ACH240, ACH245, ACH250 FLEX – AtriClip FLEX[3]

1 Piston	4 Tige	7 Boucle de déploiement
2 Poignée	5 Agrafe Gillinov–Cosgrove	8 Zone malléable†
3 Zone de coupe de suture	6 Ancrages de suture	

†Chaque pièce à main AtriClip possède une région malléable différente.
[1]La tige du dispositif AtriClip long est malléable sur toute sa longueur.
[2]La zone malléable du dispositif AtriClip standard est indiquée par un ensemble de fentes sur l'axe près de la boucle de déploiement. Elle n'est prévue que pour des ajustements mineurs dans le plan latéral (gauche/droite).
[3]La tige du dispositif AtriClip FLEX est malléable sur toute sa longueur. Elle est prévue pour des ajustements jusqu'à 45° dans tous les plans.

⚠ **ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE PRODUIT**

IMPORTANT !

Ce manuel est conçu pour faciliter l'utilisation du produit. Il ne sert pas de référence pour les techniques chirurgicales.

USAGE RECOMMANDÉ

Le système d'exclusion AtriClip LAA est indiqué pour une occlusion ouverte de l'appendice atrial gauche du cœur.

CONTRE-INDICATIONS

1. Ne pas utiliser ce dispositif comme un dispositif d'occlusion tubaire contraceptif.
2. Ne pas utiliser ce dispositif si le patient souffre d'une allergie connue au nitinol (alliage nickel titane).

L'implantation de l'agrafe ne présente pas d'autres risques et/ou effets secondaires que ceux généralement associés aux procédures de chirurgie cardiaque.

⚠ **AVERTISSEMENTS**

1. Ne pas essayer de replacer ou retirer l'agrafe après l'avoir déployée. Ceci risquerait d'endommager ou de déchirer les tissus.
2. Utiliser exclusivement ce dispositif de la manière prévue.
3. Ne pas utiliser sur des tissus qui, selon le chirurgien ne tolèrent pas des articles de suture ou des techniques de fermeture conventionnelles (comme les agrafes chirurgicales).
4. Évaluer soigneusement la position de l'agrafe, l'épaisseur du tissu et la largeur du tissu avant de déployer l'agrafe. Afin de déterminer la taille d'agrafe appropriée, se reporter aux instructions du guide de sélection Gillinov-Cosgrove dans le mode d'emploi. Tout défaut de dimensionnement ou de déploiement correct de l'agrafe peut entraîner : un traumatisme tissulaire, une déhiscence, un déchirement tissulaire, un déplacement et/ou une absence d'hémostase désirée.
5. Ne pas utiliser sur un LAA d'une largeur inférieure à 29 mm avec une épaisseur de paroi de moins de 1,0 mm.
6. Ne pas utiliser sur un LAA supérieur à 50 mm lorsque le tissu est n'est pas compressé.
7. Ne pas utiliser ce produit si le patient souffre d'une sensibilité élevée au nickel (alliage nickel titane).

⚠ **PRÉCAUTIONS**

1. Lire attentivement toutes les instructions du système d'exclusion LAA AtriClip. Le non-respect des instructions peut entraîner le mauvais fonctionnement du dispositif.
2. Le dispositif doit être utilisé uniquement par un personnel médical formé et qualifié.
3. Il convient de remarquer que les variations de procédure peuvent survenir en fonction des techniques du chirurgien et de l'anatomie du patient.
4. Ne pas faire tomber ni secouer le dispositif afin de ne pas l'endommager. En cas de chute, ne pas utiliser le dispositif. Le remplacer par un neuf.
5. Si l'emballage stérile est endommagé et/ou que la protection stérile est compromise, éliminer le dispositif, NE PAS L'UTILISER.
6. NE PAS RESTÉRILISER. Le système d'exclusion LAA AtriClip est fourni STÉRILE et il est prévu pour un usage UNIQUE exclusivement. Une restérilisation pourrait entraîner une perte de fonction ou des blessures pour le patient.
7. Déterminer attentivement tout traitement préchirurgical que le patient peut avoir suivi et lors de la sélection correspondante de la taille de l'agrafe. Une radiothérapie pré-opératoire peut entraîner une modification des tissus. Ces modifications peuvent, par exemple, entraîner un épaississement des tissus dépassant la plage indiquée pour la taille d'agrafe sélectionnée.
8. Ne pas modifier cet instrument. L'utilisation d'un dispositif modifié peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement. AtriCure, Inc. ne garantit pas les caractéristiques de performance de ce produit en cas de modifications apportées au système d'exclusion LAA AtriClip.
9. Ne pas plier ni cintrer excessivement la tige afin de ne pas affecter la performance du dispositif.
10. Évacuer le thrombus du LAA avant l'application de l'agrafe, comme avec toute autre technique chirurgicale conventionnelle d'occlusion du LAA. L'évaluation de la présence d'un thrombus devrait être réalisée à la discrétion du chirurgien et selon la norme de soin.
11. Positionner et déployer l'agrafe de manière à visualiser clairement tous les tissus ciblés. Une mauvaise visualisation peut entraîner un positionnement inadéquat.
12. Veiller à ne pas trop manipuler le LAA et l'agrafe après le déploiement de l'agrafe.
13. Il est recommandé de déployer l'agrafe dans un champ sec.
14. Ne pas utiliser l'agrafe à des températures inférieures à 20 °C. L'utilisation de l'agrafe à des températures inférieures à 20 °C peut affecter les performances du dispositif.

MODE D'EMPLOI

À l'aide du guide de sélection Gillinov-Cosgrove, le chirurgien doit exercer son jugement afin de déterminer quelle taille d'agrafe appliquer.

SÉLECTION DE L'AGRAFE

1. Utiliser le guide de sélection Gillinov-Cosgrove afin de sélectionner l'agrafe LAA Gillinov-Cosgrove adéquate. Les dimensions des agrafes figurent sur l'emballage du dispositif.

Taille de l'agrafe	Gamme de taille des LAA (largeur des LAA)
35 mm	29 à 35 mm
40 mm	34 à 40 mm
45 mm	39 à 45 mm
50 mm	44 à 50 mm

2. En respectant une technique stérile, sortir le système d'exclusion LAA AtriClip de son emballage.
3. La tige malléable du système d'exclusion AtriClip LAA peut être remodelée pour faciliter l'accès au LAA. Appliquer une légère pression pour façonner la tige du dispositif en fonction des variations anatomiques.

⚠ ***Attention :*** ne pas saisir la boucle de déploiement du dispositif pour cintrer la tige, car cela pourrait endommager le dispositif. Appliquer une force de flexion en concentrant soigneusement la force sous les deux pouces. Une flexion ou un cintrage excessif de la tige est susceptible d'affecter les performances du dispositif. Ne pas essayer de tordre la boucle de déploiement du dispositif car cela pourrait endommager le dispositif.

4. À l'aide du levier d'activation sur la poignée ou du piston, ouvrir et fermer délicatement l'agrafe afin de vérifier son bon fonctionnement.

⚠ ***Attention :*** avant le déploiement, ne pas ouvrir et fermer l'agrafe plus de 3 fois à l'aide du piston ou du levier d'activation.

Articulation de l'effecteur terminal – s'applique à LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 et LAAØ50.



5. Il est possible d'articuler manuellement la boucle de déploiement du système d'exclusion LAA AtriClip, de 0° (dans l'alignement – à la livraison) à ±90° par rapport à la tige afin de faciliter le bon positionnement de l'agrafe LAA Gillinov-Cosgrove et de tenir compte des variations dans l'anatomie du patient.

POSITIONNEMENT DE L'AGRAFE

6. Manœuvrer le système d'exclusion LAA AtriClip dans le plan de dissection ciblé.
7. Ouvrir délicatement l'agrafe en déplaçant le levier d'activation vers l'arrière ou en appuyant sur le piston.

REMARQUE : il est possible de verrouiller l'agrafe en position ouverte à l'aide du système de verrouillage placé dans la poignée du dispositif. Le verrou est embrayé lorsque le levier est activé et il peut être débrayé en déplaçant délicatement le levier vers la gauche. S'applique à LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 et LAAØ50.

REMARQUE : l'agrafe peut être verrouillée en position ouverte en appuyant sur le piston jusqu'à entendre un clic puis en relâchant le piston. Pour déverrouiller et fermer l'agrafe, appuyer à fond sur le piston et relâcher lentement jusqu'à ce que l'agrafe soit fermée. S'applique à ACH135, ACH140, ACH145 et ACH150.

8. Orienter l'applicateur d'agrafe avec l'agrafe préalablement chargée au bout du LAA avec les extrémités de l'agrafe pointées à l'opposé du LAA.



9. Positionner doucement l'agrafe sur la base du LAA.

10. Positionner l'agrafe de manière à bien visualiser tous les tissus ciblés.
11. Lorsque l'agrafe est encore liée au dispositif de déploiement, veiller à ce que les structures avoisinantes n'interfèrent pas ou n'endommagent pas l'agrafe et s'assurer que l'agrafe est correctement positionnée.
12. Si l'agrafe n'est pas placée correctement, ouvrir doucement l'agrafe et la replacer convenablement.

DÉPLOIEMENT

13. Après avoir correctement positionné l'agrafe, relâcher le levier d'activation ou le piston pour permettre à l'agrafe de se fermer.
14. Déployer l'agrafe en coupant manuellement la suture au niveau de la zone de coupe désignée sur le levier ou la poignée.



15. En exerçant une contre-pression sur l'agrafe, retirer doucement la boucle de déploiement du LAA de la manière illustrée en laissant l'agrafe et la suture de fixation derrière.

⚠ ***Attention :*** après avoir coupé manuellement les sutures, il est impossible d'utiliser le système d'exclusion LAA AtriClip pour replacer ou retirer l'agrafe.

16. Une fois l'agrafe déployée, retirer les sutures de fixation en tirant doucement une suture à la fois tout en exerçant une contre-traction sur l'agrafe à la discrétion du chirurgien. Ne pas couper le tissu de l'agrafe.



17. Jeter le dispositif de déploiement après utilisation. Se conformer à la réglementation et aux programmes de recyclage locaux en vigueur relatifs à la mise au rebut et au recyclage des composants de l'appareil.

RETOUR DE PRODUIT UTILISÉ

Si ce produit doit être renvoyé à AtriCure, Inc., un numéro d'autorisation de retour de marchandise (return goods authorization, RGA) doit vous être communiqué par AtriCure, Inc. avant expédition.

Si le produit a été en contact avec du sang ou des liquides corporels, il faut le nettoyer et le désinfecter soigneusement avant de l'emballer. Il doit être expédié dans son carton d'origine ou dans un carton équivalent pour éviter tout dommage pendant le transport et il doit être correctement étiqueté avec un numéro RGA et une indication de la nature du risque biologique que présente le contenu de l'envoi.

Les consignes de nettoyage et les matériaux, y compris les conteneurs d'expédition adaptés, l'étiquetage approprié et le numéro RGA, peuvent être obtenus auprès de AtriCure, Inc.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Il incombe aux utilisateurs de vérifier que ce produit est en bon état avant de l'utiliser ainsi que de s'assurer qu'il n'est utilisé que de la manière décrite dans ce mode d'emploi, et notamment qu'il n'est pas réutilisé. AtriCure, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage, perte ou dépense, indirect(e) ou entraînant des dommages et intérêts spéciaux, qui résulte d'une mauvaise utilisation ou réutilisation délibérée de ce produit, y compris tout dommage, perte ou dépense lié(e) à des blessures corporelles ou à des dégâts matériels.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MANIPULATION : AGRAFE LAA GILLINOV-COSGROVE

INFORMATIONS RELATIVES À L'IRM

⚠ **COMPATIBLE AVEC L'IRM SOUS CERTAINES CONDITIONS**

Des tests non cliniques ont démontré que l'agrafe AOD1 (Annular Occlusion Device, dispositif d'occlusion annulaire) est compatible avec l'IRM sous certaines conditions. Un patient équipé de ce dispositif peut subir un examen dans un système RM en toute sécurité, immédiatement après l'implantation, dans les conditions suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 Tesla et de 3 Tesla, uniquement
- Champ magnétique de gradient spatial maximal de 4 000 gauss/cm (40 T/m) (extrapolé) ou moins
- Taux d'absorption spécifique (TAS) maximal moyen sur la totalité du corps, rapporté par le système RM, de 4 W/kg pour 15 minutes d'IRM (c'est-à-dire par séquence d'impulsions), en mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau pour le système RM
- Dans les conditions d'examen IRM définies pour l'agrafe AOD1, une augmentation maximale de température de 2,9 °C est attendue après 15 minutes d'IRM en continu (c'est-à-dire par séquence d'impulsions)

INFORMATION CONCERNANT LES ARTÉFACTS

Dans le cadre de tests non cliniques, l'artéfact provoqué par l'agrafe AOD1 s'est étendu à environ 10 mm par rapport à l'agrafe AOD1, lors de séquences d'impulsion en écho de gradient avec un système RM de 3 Tesla.

EXPLICATION DES SYMBOLES SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE

Se reporter à l'étiquette de l'emballage extérieur pour consulter les symboles qui s'appliquent à ce produit.

hu	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	MAGYAR

AtriClip® LAA-lezáró rendszer előre behelyezett Gillinov–Cosgrove®-kapoccsal

ISMERTETÉS

Az AtriClip LAA-lezáró rendszer a szív bal pitvari fülcséjének (LAA) nyitott lezárására szolgáló Gillinov–Cosgrove LAA-kapcsot (kapocs) tartalmazza. A kapocs előre be van helyezve egy eldobható kapocsfelhelyező eszközbe. Az előre behelyezett Gillinov–Cosgrove-kapoccsal ellátott AtriClip LAA-lezáró rendszer nem tartalmaz természetes latexgumiból készült összetevőt.

ATRICLIP LAA-LEZÁRÓ RENDSZER ÁBRÁZOLÁS ÉS AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE

(LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45, LAAØ50) – AtriClip Long[1]

1 Markolat	5 Formázható szár	9 Felhelyezőhurok
2 Aktiválókar	6 Csuklós kengyel	10 Csuklós felhelyezőhurok
3 Fonalvágási zóna	7 Gillinov–Cosgrove kapocs	
4 Orrkúp kapocsméret-azonosítóval	8 Fonalhorgonyok	

(ACH135, ACH140, ACH145, ACH150) - AtriClip Standard[2]
(ACH235, ACH240, ACH245, ACH250) FLEX – AtriClip FLEX[3]

1 Henger	4 Szár	7 Felhelyezőhurok
2 Markolat	5 Gillinov–Cosgrove kapocs	8 Formázható rész
3 Fonalvágási zóna	6 Fonalhorgonyok	

en †Each AtriClip handpiece has a different malleable region.\hu †Minden AtriClip kézi eszköznek különböző helyen van az alakítható része.
en [1]The entire length of the AtriClip Long device's shaft is malleable.\hu [1]Az AtriClip Long eszköz szára teljes hosszúságában formázható.
en [2]The AtriClip Standard device's malleable zone is denoted by a set of slots on the shaft near the deployment loop. It is only intended for minor adjustments in the lateral (left/right) plane.\hu [2]Az AtriClip Standard készülék formázható részét a tengelyen, a felhelyezőhurok közelében található nyílások jelzik. Csak oldalirányú (bal/jobb), kisebb mértékű formázásra szolgál.
en [3]The entire length of the AtriClip FLEX device's shaft is malleable. It is intended for adjustments up to 45° in all planes.\hu [3]Az AtriClip FLEX eszköz szára teljes hosszúságában formázható. Minden síkban akár 45°-os hajlításra alkalmas.

⚠ **FIGYELEM! A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT**

FONTOS:

Ez a tájékoztató segítséget nyújt a termék használatához. Nem a műtéti technika leírására szolgál.

A HASZNÁLAT JAVALLATA

Az AtriClip LAA-lezáró rendszer a szív bal pitvari fülcséjének nyitott lezárására javallott.

ELLENJAVALLATOK

1. Ne használja ezt az eszközt a petevezeték fogamzásgátlás céljából végzett elzárására.
2. Ne használja ezt az eszközt, ha a beteg ismerten allergiás a nitinolra (nikkel-titán) ötvözetre.

A kapocs beültetésével kapcsolatban nincsenek további kockázatok és/vagy mellékhatások a szívsebészeti beavatkozásokhoz jellemzően társuló kockázatokon és/vagy mellékhatásokon kívül.

⚠ **VIGYÁZAT!**

1. A kapocs felhelyezése után ne próbálkozzon az áthelyezésével vagy eltávolításával. Ez a szövetek sérülését és szakadását okozhatja.
2. Csak rendeltetésszerűen használja ezt az eszközt.
3. Ne használja olyan szöveteken, amelyek a sebész megítélése szerint nem tolerálnák a hagyományos sebészeti varratanyagokat vagy a hagyományos lezárási technikákat (például a kapocsbehelyezést).
4. A kapocs felhelyezése előtt gondosan értékelje a kapocs elhelyezkedését, illetve a szövetek vastagságát és szélességét. A kapocs megfelelő méretének megállapításához lásd a Gillinov–Cosgrove méretválasztó eszköz használati utasítását. A kapocs méretének nem megfelelő választása vagy nem megfelelő felhelyezése a következőket okozhatja: szövetsérülés, sebszétválás, a szövetek szakadása, az eszköz elmozdulása, illetve a kívánt véralvadás elmaradása.
5. Ne használja, ha az LAA szélessége nem éri el a 29 mm-t vagy a falvastagsága az 1,0 mm-t.
6. Ne használja, ha az LAA szélessége a szövetek összenyomása nélkül több mint 50 mm.
7. Ne használja ezt az eszközt, ha a beteg érzékeny a nikkelre (nikkel-titán ötvözetre).

⚠ **ÓVINTÉZKEDÉSEK**

1. Gondosan olvassa végig az AtriClip LAA-lezáró rendszerhez tartozó utasításokat. Az utasítások megfelelő betartásának elmulasztása az eszköz nem megfelelő működését okozhatja.
2. Az eszközt csak megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező sebész használhatja.
3. Vegye figyelembe, hogy az egyes beavatkozások között előfordulhatnak eltérések a sebész által használt technikáktól és a beteg anatómiájától függően.
4. Ne ejtse le és ne lökje meg az eszközt, mert ez károsíthatja. Ha az eszköz leesett, ne használja. Használjon helyette új eszközt.
5. Ha a steril csomagolás megsérült és/vagy leesik, vagy a sterilitási határ megsérül, dobja ki az eszközt, és NE HASZNÁLJA.
6. TILOS ÚJRASTERILIZÁLNI. Az AtriClip LAA-lezáró rendszer STERILEN kerül forgalomba, és csak EGYETLEN használatra szolgál. Az újrasterilizálás az eszköz működésképtelenségét vagy a beteg sérülését okozhatja.
7. Vegye figyelembe a betegen a műtét előtt végzett kezelések hatását a kapocs méretének megválasztásakor. A műtét előtt végzett sugárkezelés hatására megváltozhatnak a szövetek jellemzői. Ilyen változás például, hogy a szövetek vastagsága meghaladhatja a kiválasztott kapocsmérethez alkalmas tartományt.
8. Ne módosítsa ezt az eszközt. A módosítás az eszköz nem megfelelő működését okozhatja. Az AtriCure, Inc. nem vállal felelősséget a termék működési jellemzőiért, ha az AtriClip LAA-lezáró rendszert módosították.
9. Ne törje meg a szárat, és ne hajlítsa meg túl erősen, mert ez ronthatja az eszköz működését.
10. A többi hagyományos LAA-lezárási műtéti technikához hasonlóan a kapocs felhelyezése előtt távolítsa el a trombust az LAA-ból. A thrombus jelenlétének értékelését a sebész megítélése és a szokásos gyakorlat alapján kell végezni.
11. Olyan helyzetben tartsa és helyezze fel a kapcsot, hogy jól látható legyen az összes feltárt szövet. A műtéti terület nem megfelelő láthatósága az optimálisnál rosszabb behelyezési eredményt okozhat.
12. Ügyeljen arra, hogy a kapocs felhelyezése után lehetőleg ne mozgassa az LAA-t és a kapcsot.
13. Ajánlott a kapcsot száraz területen felhelyezni.
14. Ne használja a kapcsot 20 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. A kapocs 20 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten való alkalmazása ronthatja az eszköz működését.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az alkalmazandó kapocs méretét a sebész megítélése alapján, a Gillinov–Cosgrove méretválasztó eszköz segítségével kell kiválasztani.

A KAPOCS KIVÁLASZTÁSA

1. A Gillinov–Cosgrove méretválasztó eszköz használatával állapítsa meg a választandó Gillinov–Cosgrove LAA-kapcsot. A kapcsok mérete a csomagoláson van feltüntetve.

A kapocs mérete	LAA méretének (LAA szélességének) tartománya
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. Steril technikával vegye ki az AtriClip LAA-lezáró rendszert a csomagolásából.
3. Az AtriClip LAA-lezáró rendszer formázható szára az LAA-hoz való hozzáférés elősegítése érdekében alakítható. Ha szükséges az anatómiai eltérések miatt, óvatos nyomással hajlítsa eszköz szárát.

⚠ ***Figyelem!*** A szár hajlításához ne a felhelyezőhurkot fogja meg, mert ez az eszköz sérülését okozhatja. A hajlításhoz a két hüvelykujja közötti részre fejtse ki az erőt. A szár túl nagy mértékű elhajlítása vagy megtörése ronthatja az eszköz működését. Ne próbálkozzon a felhelyezőhurok csavarásával, mert ez károsíthatja az eszközt.

4. A hengerrel vagy a markolaton található aktiválókarral óvatosan nyissa ki és zárja be a kapcsot, hogy meggyőződjön a megfelelő működéséről.

⚠ ***Figyelem!*** Ne nyissa ki és zárja be a kapcsot a hengerrel vagy az aktiválókarral több mint 3-szor, mielőtt felhelyezi.

A kezelővég hajlítása – az LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 és LAAØ50 típusokra vonatkozik.



5. Az AtriClip LAA-lezáró rendszeren található felhelyezőhurok kézzel elhajlítható 0° (egyenes állás, ilyen helyzetben kerül forgalomba) és ± 90° között, hogy segítsen a Gillinov–Cosgrove LAA-kapocs megfelelő felhelyezésében a beteg anatómiai jellegzetességei figyelembevételével.

A KAPOCS ELHELYEZÉSE

6. Vezesse az AtriClip LAA-lezáró rendszert a megcélzott disszekciós síkba.
7. Óvatosan nyissa ki a kapcsot az aktiválókar hátrafelé történő mozgatásával vagy a henger lenyomásával.

MEGJEGYZÉS: A kapocs nyitott helyzetben rögzíthető az eszköz markolatán található rögzítőeszközzel. A kar aktiválásakor a zár rögzül, és kioldható a kart óvatosan balra elmozdítva. Az LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 és LAAØ50 típusokra vonatkozik.

MEGJEGYZÉS: A kapocs nyitott helyzetben rögzíthető a henger lenyomásával a kattanásig, majd a henger felengedésével. A kapocs kioldásához és bezárásához nyomja le teljesen a hengert, majd lassan engedje fel, amíg a kapocs bezáródik. Az ACH135, ACH140, ACH145 és ACH150 típusokra vonatkozik.

8. Irányítsa az előre behelyezett kapoccsal ellátott kapocsfelhelyező eszközt az LAA csúcsához, úgy, hogy a kapocs végein található hurkok az LAA-tól távolodó irányba tekintsenek.



9. Óvatosan helyezze a kapcsot az LAA alapjához.

10. Úgy tartsa a kapcsot, hogy tisztán látható legyen az összes feltárt szövet.
11. Miközben a kapocs még a felhelyezőeszközhöz rögzítve van, győződjön meg arról, hogy a környező szövetek nem zavarják a kapocs működését, és a kapocs nem sérti meg ezeket, illetve hogy a kapocs megfelelően van elhelyezve.
12. Ha a kapocs nem megfelelően helyezkedik el, óvatosan nyissa ki a kapcsot, és helyezze a megfelelő helyre.

FELHELYEZÉS

13. A kapocs megfelelő elhelyezése után engedje vissza az aktiválókart vagy a hengert, hogy a kapocs bezáródhasson.
14. A kapocs leválasztásához kézzel vágja el a fonalat a karon vagy a markolaton lévő kijelölt vágási zónában.



15. A kapocsra gyakorolt ellennyomással óvatosan távolítsa el a felhelyezőhurkot az LAA-ból az alábbi ábrán látható módon, helyben hagyva a kapcsot és a rögzítővarratot.

⚠ ***Figyelem!*** A fonalak kézi elvágása után az AtriClip LAA-lezáró rendszer már nem használható a kapocs áthelyezésére vagy eltávolítására.

16. A kapocs leválasztása után, a rögzítővarratokat óvatosan, egyesével húzva távolítsa el, miközben a sebész megítélése szerint ellenkező irányban húzza a kapcsot. Ne vágja át a kapocs anyagát.

17. Használat után dobja el a felhelyezőeszközt. Kövesse az eszköz összetevőinek ártalmatlanítására vagy újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásokat és újrahasznosítási terveket.

A HASZNÁLT TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSE

Ha a terméket bármilyen okból vissza kell küldeni az AtriCure, Inc. részére, a szállítás előtt áru-visszaküldési engedély (RGA) számot kell kérni az AtriCure, Inc. vállalattól.

Ha a termék vérrel vagy testnedvekkel érintkezésbe került, a becsomagolás előtt alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. A szállítás közben bekövetkező sérülés elkerülése érdekében a terméket az eredeti vagy ezzel egyenértékű dobozban kell szállítani, és a csomagoláson fel kell tüntetni az RGA-számot és a tartalom biológiai veszélyességének jelzését.

A tisztításra és a csomagolóanyagokra, többek között a szállítási tárolókra és a megfelelő feliratozásra vonatkozó utasítások és az RGA-szám az AtriCure, Inc. vállalattól szerezhetők be.

NYILATKOZAT

A felhasználók felelőssége a használat előtt ellenőrizni, hogy a termék elfogadható állapotban van-e, valamint biztosítani, hogy a terméket csak az ebben a használati utasításban leírtaknak megfelelően használják, többek között azt, hogy a terméket ne használják fel újra. Az AtriCure, Inc. semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a termék szándékos helytelen használatából vagy ismételt felhasználásából eredő véletlen, különleges vagy következményes veszteségekért, károkért vagy költségekért, beleértve a személyi sérüléssel vagy anyagi kárral kapcsolatos veszteségeket, károkat és költségeket.

KEZELÉSI INFORMÁCIÓK: GILLINOV–COSGROVE LAA-KAPOCS

AZ MR-VIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

⚠ **FELTÉTELESEN ALKALMAS MR-KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNÁLATRA**

Nem klinikai vizsgálattal kimutatták, hogy az AOD1 (gyűrűs elzáróeszköz) kapocs feltételesen alkalmas MR-környezetben való használatra. Az ilyen eszközzel élő betegek biztonságosan vizsgálhatók MR-rendszerrel közvetlenül a felhelyezés után, a következő feltételek mellett:

- Kizárólag 1,5 T vagy 3 T térerősségű statikus mágneses mező.
- A mágneses mező térbeli gradiense legfeljebb 4000 gauss/cm (40 T/m) (extrapolált érték).
- Az MR-rendszer által jelentett, teljes testre átlagolt specifikus abszorpciós arány (SAR) legfeljebb 4 W/kg 15 perces vizsgálat esetén (impulzusszekvenciánként) az MR-rendszer első szintű szabályozott üzemmódjában.
- A megadott vizsgálati feltételek mellett az AOD1 kapocs várhatóan legfeljebb 2,9 °C hőmérséklet-növekedést okoz 15 perces folyamatos vizsgálat után (impulzusszekvenciánként).

MŰTERMÉKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A nem klinikai vizsgálat során 3 T térerősségű MR-rendszerben, gradiensecho impulzusszekvencia esetén az AOD1 kapocs által okozott képműtermék körülbelül 10 mm-rel terjedt túl az AOD1 kapocs képén.

hr	UPUTE ZA UPORABU	HRVATSKI

Sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip® s ugrađenom kopčom Gillinov-Cosgrove®

OPIS

Sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip sadrži kopču Gillinov-Cosgrove za aurikulu lijevog atrija (kopča) za otvorenu okluziju aurikule lijevog atrija na srcu (engl. left atrial appendage, LAA). Kopča je tvornički ugrađena na jednokratni aplikator kopče. Sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip s tvornički ugrađenom kopčom Gillinov-Cosgrove ne sadržava komponente od lateksa od prirodne gume.

ILUSTRACIJA I NAZIVI komponenata sustava za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip

LAA Ø35, LAA Ø40, LAA Ø45, LAA Ø50 – AtriClip dugi[1]

1 Ručka	5 Savitljivo tijelo	9 Ušica za aplikaciju
2 Poluga za aktivaciju	6 Zglobna spojnica	10 Zglobna ušica za aplikaciju
3 Mjesto za rezanje konca	7 Kopča Gillinov-Cosgrove	
4 Nosni konus s identifikatorom veličine kopče	8 Sidrišta konca	

ACH135, ACH140, ACH145, ACH150 – AtriClip standardni[2]
ACH235, ACH240, ACH245, ACH250 FLEX – AtriClip FLEX[3]

1 Klip	4 Tijelo	7 Ušica za aplikaciju
2 Ručka	5 Kopča Gillinov-Cosgrove	8 Savitljivi dio†
3 Mjesto za rezanje konca	6 Sidrišta konca	

†Na svakom je ručnom instrumentu AtriClip neko drugo područje savitljivo.
[1]Tijelo proizvoda AtriClip dugi savitljivo je cijelom duljinom.
[2]Savitljivi dio proizvoda AtriClip standardni označen je utorima na tijelu u blizini ušice za aplikaciju. Predviđeno je samo za manje prilagodbe (lijevo/desno) u lateralnoj ravnini.
[3]Tijelo proizvoda AtriClip FLEX savitljivo je cijelom duljinom. Predviđeno je za prilagodbe do 45° u svim ravninama.

⚠ **OPREZ: PRIJE UPORABE OVOG PROIZVODA TEMELJITO PROČITAJTE INFORMACIJE U NASTAVKU**

VAŽNO!

Svrha je ovog priručnika da posluži kao pomoć pri uporabi ovog proizvoda. Ne služi kao smjernica za primjenu kirurških tehnika.

INDIKACIJE ZA UPORABU

Sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip indiciran je za otvorenu okluziju aurikule lijevog atrija na srcu.

KONTRAINDIKACIJE

1. Proizvod nemojte upotrebljavati kao proizvod za kontraceptivnu okluziju jajovoda.
2. Proizvod nemojte upotrebljavati ako je u pacijenta poznata alergija na nitinol (slitinu nikla i titanija).

S implantacijom kopče nisu povezani dodatni rizici ni nuspojave osim onih koji su tipično povezani s kardiološkim kirurškim zahvatima.

⚠ **UPOZORENJA**

1. Nemojte pokušavati ponovno postavljati ili uklanjati kopču nakon aplikacije. To može dovesti do oštećenja ili pucanja tkiva.
2. Proizvod upotrebljavajte isključivo u skladu s predviđenom namjenom.
3. Nemojte upotrebljavati na tkivu koje, prema mišljenju kirurga, ne bi moglo podnijeti uobičajene materijale za šivanje ili uobičajene tehnike zatvaranja (npr. uporabu kirurških spajalica).
4. Pažljivo procijenite položaj kopče, debljinu tkiva i širinu tkiva prije aplikacije kopče. Da biste odredili odgovarajuću veličinu kopče, pogledajte upute za uporabu u obliku vodiča za odabir kopče Gillinov-Cosgrove. Odabir neodgovarajuće veličine kopče ili neispravna aplikacija kopče mogu dovesti do oštećenja tkiva, dehiscencije, pucanja tkiva, neodgovarajućeg postavljanja i/ili nedostatka željene hemostaze.
5. Nemojte upotrebljavati na aurikuli lijevog atrija širine manje od 29 mm i debljine stijenke manje od 1,0 mm.
6. Nemojte upotrebljavati na aurikuli lijevog atrija širine veće od 50 mm kad tkivo nije pritisnuto.
7. Proizvod nemojte upotrebljavati ako je pacijent osjetljiv na nikal (slitinu nikla i titanija).

⚠ **MJERE OPREZA**

1. Pažljivo pročitajte sve upute za sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip. Posljedica nepotpunog pridržavanja uputa može biti nepravilno funkcioniranje proizvoda.
2. Proizvod smiju upotrebljavati isključivo medicinsko osoblje s odgovarajućom obukom i kvalifikacijama.
3. Imajte na umu da se konkretni zahvati mogu razlikovati zbog različitih tehnika liječnika i anatomija pacijenata.
4. Proizvod nemojte ispuštati s visine niti bacati jer to može uzrokovati oštećenje proizvoda. Ako vam proizvod ispadne, nemojte ga upotrebljavati. Zamijenite ga novim proizvodom.
5. Ako se sterilna ambalaža ošteti i/ili ako dođe do narušavanja integriteta sterilne obloge, odložite proizvod i NEMOJTE GA UPOTREBLJAVATI.
6. NEMOJTE PONOVNO STERILIZIRATI. Sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip isporučuje se sterilan i namijenjen je isključivo za JEDNOKRATNU uporabu. Ponovna sterilizacija može dovesti do gubitka funkcionalnosti proizvoda ili ozljede pacijenta.
7. Uzmite u obzir sva predoperativna liječenja kojima je pacijent bio podvrgnut te sukladno tomu odaberite veličinu kopče. Predoperativna radioterapija može dovesti do promjena u tkivu. Te promjene mogu, primjerice, dovesti do povećanja debljine tkiva iznad naznačenog raspona za odabranu veličinu kopče.
8. Ovaj instrument nemojte podvrgavati izmjenama. Uporaba instrumenta koji je bio podvrgnut izmjenama može dovesti do neispravnog rada instrumenta. Društvo AtriCure, Inc. ne daje nikakve tvrdnje ili izjave u vezi s radnim značajkama ovog proizvoda ako se sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip podvrgne bilo kakvim izmjenama.
9. Nemojte uvijati niti prekomjerno savijati tijelo jer to može utjecati na radne značajke proizvoda.
10. Izbacite tromb iz aurikule lijevog atrija prije aplikacije kopče kao što je to slučaj i pri ostalim uobičajenim kirurškim tehnikama okluzije aurikule lijevog atrija. Izbacivanje tromba mora se provesti prema nahođenju kirurga i njegovim normama liječenja.
11. Kopču postavite i aplicirajte tako da omogućuje dobru vidljivost svih tkiva kojima se pristupa. Nedostatan vizualni nadzor može dovesti do neoptimalnog postavljanja.
12. Manipulaciju aurikulom lijevog atrija i kopčom nakon aplikacije kopče svedite na najmanju moguću mjeru.
13. Preporučuje se da se kopča aplicira na suho područje.
14. Kopču nemojte upotrebljavati pri temperaturama nižim od 20 °C. Aplikacija kopče pri temperaturama nižim od 20 °C može utjecati na radne značajke proizvoda.

UPUTE ZA UPORABU

Odabir kopče za aplikaciju provodi se prema nahođenju kirurga s pomoću priručnika za odabir kopče Gillinov-Cosgrove.

ODABIR KOPČE

1. Uporaba vodiča za odabir kopče Gillinov-Cosgrove pri odabiru prikladne kopče Gillinov-Cosgrove za aurikulu lijevog atrija. Informacije o veličinama kopči nalaze se na ambalaži proizvoda.

Veličina kopče	Raspon veličina aurikule lijevog atrija (širina aurikule lijevog atrija)
35 mm	29 – 35 mm
40 mm	34 – 40 mm
45 mm	39 – 45 mm
50 mm	44 – 50 mm

2. Primjenom sterilne tehnike izvadite sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip iz ambalaže.
3. Savitljivo tijelo sustava za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip može se preoblikovati radi lakšeg pristupa aurikuli lijevog atrija. Blagim pritiskom preoblikujte tijelo instrumenta da biste ga uskladili s anatomskim varijacijom.

⚠ ***Oprez:*** Prilikom savijanja tijela nemojte držati ušicu za aplikaciju jer se proizvod time može oštetiti. Savijanje obavite blagim koncentriranim pritiskom obama palcima. Prekomjerno savijanje ili uvijanje tijela može utjecati na radne značajke proizvoda. Ušicu za aplikaciju nemojte pokušavati uviti jer to može uzrokovati oštećenje proizvoda.

4. Pomoću klipa ili poluge za aktivaciju na ručki pažljivo otvorite i zatvorite kopču da biste provjerili funkcionira li ispravno.

⚠ ***Oprez:*** Kopču prije aplikacije nemojte otvarati i zatvarati pomoću klipa ili aktivacijske poluge više od 3 puta.

Artikulacija krajnjeg izvršnog elementa – odnosi se na LAA Ø35, LAA Ø40, LAA Ø45 i LAA Ø50.



5. Ušica za aplikaciju sustava za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip može se ručno artikulirati od 0° (u ravnini – isporučeni oblik) do ± 90° u odnosu na tijelo. Na taj se način olakšava pravilno postavljanje kopče Gillinov-Cosgrove za aurikulu lijevog atrija u skladu s razlikama u anatomiji pacijenata.

POSTAVLJANJE KOPČE

6. Postavite sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip u ciljnu disekcijsku ravninu.
7. Pažljivo otvorite kopču pomicanjem poluge za aktivaciju prema natrag ili potiskivanjem klipa.

NAPOMENA: kopča se može zaključati u otvorenom položaju pomoću značajke za zaključavanje na ručki proizvoda. Proizvod se zaključava aktivacijom poluge, a može se otključati pažljivim pomicanjem poluge ulijevo. Odnosi se na LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 i LAAØ50.

NAPOMENA: kopča se može zaključati u otvorenom položaju tako da se klip potiskuje dok ne škljocne, a zatim otpusti. Da biste otključali i zatvorili kopču, potisnite klip do kraja, a zatim ga polako otpustite dok se kopča ne zatvori. Odnosi se na ACH135, ACH140, ACH145 i ACH150.

8. Usmjerite aplikator kopče s tvornički ugrađenom kopčom prema vrhu aurikule lijevog atrija tako da petlje na krajevima kopče budu okrenute suprotno od aurikule lijevog atrija.



9. Pažljivo postavite kopču u podnožje aurikule lijevog atrija.

10. Kopču postavite tako da omogućuje dobru vidljivost svih tkiva kojima se pristupa.
11. Dok se kopča pričvršćuje na proizvod za aplikaciju, pobrinite se da okolne strukture ne dođu u doticaj s kopčom ili da ih kopča ne ošteti te da se kopča ispravno postavi.
12. Ako kopča nije pravilno postavljena, pažljivo otvorite kopču i postavite je u željeni položaj.

APLIKACIJA

13. Nakon pravilnog postavljanja kopče otpustite polugu za aktivaciju ili klip da bi se kopča zatvorila.
14. Aplicirajte kopču ručnim rezanjem konca na predviđenom mjestu za rezanje na polugi ili ručki.



15. Istovremeno pritišćući kopču u suprotnom smjeru, pažljivo uklonite ušicu za aplikaciju s aurikule lijevog atrija kako je prikazano u nastavku, ostavljajući kopču i konac za pričvršćivanje na mjestu.

⚠ ***Oprez:*** Nakon ručnog rezanja konca sustav za okluziju aurikule lijevog atrija AtriClip ne smije se upotrebljavati za premještanje ni uklanjanje kopče.

16. Nakon aplikacije kopče uklonite konce za pričvršćivanje laganim povlačeći jedan po jedan uz istovremeni pritisak na kopču u suprotnom smjeru prema nahođenju kirurga. Nemojte rezati materijal kopče.



17. Nakon uporabe proizvod za aplikaciju odložite u otpad. Pridržavajte se lokalnih mjerodavnih propisa i planova recikliranja u vezi sa zbrinjavanjem i recikliranjem komponenata uređaja.

POVRAT UPOTRIJEBLJENOG PROIZVODA

Ako se iz bilo kojeg razloga proizvod mora vratiti tvrtki AtriCure, Inc., prije slanja potrebno je od tvrtke AtriCure, Inc. zatražiti broj odobrenja za povrat robe (RGA). Ako je proizvod došao u doticaj s krvlju ili tjelesnim izlučevinama, isti se mora temeljito očistiti i dezinficirati prije pakiranja. Proizvod je potrebno slati ili u izvornom pakiranju ili ekvivalentnom pakiranju kako bi se spriječilo oštećenje tijekom isporuke. Proizvod je potrebno ispravno označiti brojem RGA i oznakom vrste biološke opasnosti sadržaja pošiljke.

Upute o čišćenju i materijalima, uključujući odgovarajuće spremnike za slanje, prikladne oznake i broj RGA, mogu se zatražiti od društva AtriCure, Inc.

IZJAVE O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Korisnici su odgovorni da odobre prihvatljivo stanje ovog proizvoda prije njegove uporabe te da osiguraju da se proizvod upotrebljava samo na način opisan u ovim uputama za uporabu, uključujući, između ostalog, brigu o tome da se proizvod ne upotrebljava više puta. Ni u kojem slučaju društvo AtriCure, Inc. nije odgovorno za bilo kakav slučajni, posebni ili posljedični gubitak, štetu ili trošak koji nastanu uslijed namjerne pogrešne ili ponovne uporabe ovog proizvoda, uključujući svaki gubitak, štetu ili trošak u ozljedom pojedinca ili oštećenjem imovine.

INFORMACIJE O RUKOVANJU: KOPČA GILLINOV-COSGROVE ZA AURIKULU LIJEVOG ATRIJA

SIGURNOSNE INFORMACIJE U VEZI SA SNIMANJEM MR-OM

⚠ **UVJETNO SIGURNO ZA MR**

Nekliničkim ispitivanjima pokazalo se da je kopča AOD1 (engl. Annular Occlusion Device, prstenasti proizvod za okluziju) uvjetno sigurna za MR. Pacijent s tim proizvodom može se sigurno snimati sustavom za MR odmah nakon postavljanja pri sljedećim uvjetima:

- isključivo statičko magnetsko polje od 1,5 tesle i od 3 tesle
- magnetsko polje s maksimalnim prostornim gradijentom od 4000 gauss/cm (40 T/m) (ekstrapoliran) ili manjim
- maksimalni uprosječen specifični stupanj apsorpcije za cijelo tijelo (SAR) izmjeren na sustavu za MR od 4 W/kg za 15 minuta snimanja (tj. po impulsnoj sekvenci) u reguliranom načinu rada prve razine (engl. First Level Controlled Operating Mode) sustava za MR
- pri uvjetima snimanja navedenim za kopču AOD1 očekuje se maksimalni porast temperature od 2,9 °C nakon 15 minuta neprekidnog snimanja (tj. po impulsnoj sekvenci)

INFORMACIJE O ARTEFAKTIMA

U nekliničkim ispitivanjima artefakt na slici koji je prouzročila kopča AOD1 proteže se otprilike 10 mm od kopče AOD1 prilikom uporabe impulsne sekvence gradijentni eho i sustava za MR od 3 tesle.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA OZNAKAMA NA AMBALAŽI

Proučite oznaku na vanjskoj ambalaži da biste saznali koji simboli vrijede za ovaj proizvod.

is	Notkunarleiðbeiningar	ÍSLENSKA

AtriClip® LAA-lokunarkerfi með forhlaðinni Gillinov-Cosgrove® klemmu

LÝSING

AtriClip LAA-lokunarkerfið inniheldur Gillinov-Cosgrove LAA klemmu (klemma) fyrir opna stíflun í vinstra ullinseyra hjartans (LAA). Klemman er forhlaðin á einnota klemmubúnaði.

AtriClip LAA-lokunarkerfið með forhlaðinni Gillinov-Cosgrove klemmu inniheldur enga íhluti úr náttúrulegu gúmmílatexi.

AtriClip LAA-lokunarkerfi SKÝRINGARMYND OG HEITI ÍHLUTA

(LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45, LAAØ50) - AtriClip, löng[1]

1 Handfang	5 Mótanlegt skaft	9 Uppsetningarlykkja
2 Virkjunarstöng	6 Liðsplitti	10 Liðstýrð uppsetningarlykkja
3 Saumskurðarsvæði	7 Gillinov-Cosgrove klemma	
4 Nefkeila sem ber kennsl á klemmustærð	8 Festingar fyrir sauma	

(ACH135, ACH140, ACH145, ACH150) - AtriClip, stöðluð[2]
(ACH235, ACH240, ACH245, ACH250) FLEX - AtriClip FLEX[3]

1 Stimpill	4 Skaft	7 Uppsetningarlykkja
2 Handfang	5 Gillinov-Cosgrove klemma	8 Mótanlegt svæði †
3 Saumskurðarsvæði	6 Festingar fyrir sauma	

† Hvert AtriClip handstykki hefur sitt sérstaka mótanlega svæði.
[1]Skaft langa AtriClip tækisins er mótanlegt að fullu á lengdina.
[2]Mótanlegt svæði stöðlaða AtriClip tækisins er gefið til kynna með raufum á skaftinu nálægt uppsetningarlykkjunni. Það er aðeins ætlað fyrir minniháttar stillingar á hliðlæga ásnum (til vinstri og hægri).
[3]Skaft AtriClip FLEX tækisins er mótanlegt að fullu á lengdina. Hægt er að stilla það um allt að 45° á öllum ásum.

⚠ **VARÚÐ: LESIÐ EFTIRFARANDI UPPLÝSINGAR VANDLEGA FYRIR NOTKUN**

MIKILVÆGT!

Þessi bæklingur er ætlaður til aðstoðar við notkun þessarar vöru. Hann er ekki ætlaður til leiðbeiningar við aðgerðir.

ÁBENDINGAR

AtriClip LAA-lokunarkerfið er ætlað fyrir opna vinstra ullinseyra hjartans.

FRÁBENDINGAR

1. Ekki má nota þetta tæki við ófrjósemisaðgerðir þar sem lokað er fyrir eggjaleiðara.
2. Ekki má nota þetta tæki ef sjúklingurinn er með þekkt ofnæmi fyrir nitínóli (nikkel og títan málmblendi).

Engin viðbótaráhætta og/eða aukaverkanir aðrar en þær sem almennt eru til staðar við hjartaskurðaðgerðir tengjast ísetningu klemmunnar.

⚠ **VARNAÐARORÐ**

1. **Ekki skal reyna að færa til eða fjarlægja klemmuna eftir að hún hefur verið sett á. Það getur valdið skemmdum eða rifum á vefjum.**
2. Notið þetta tæki eingöngu eins og til er ætlast.
3. Ekki skal nota tækið á vefi sem skurðlæknirinn telur að þoli ekki venjuleg seymisefni eða hefðbundnar lokunaraðferðir (svo sem lokun með heftum).
4. Metið vandlega stöðu klemmunnar, þykkt vefjarins og breidd áður en klemman er sett á. Til að ákvarða rétta stærð klemmu skal skoða notkunarleiðbeiningarnar fyrir Gillinov-Cosgrove-valvísinn. Ef rétt stærð er ekki valin eða klemman er notuð með röngum hætti getur það valdið: áverkum á vef, opnun, rifum á vef, tilfærslum og/eða vöntun á æskilegu samhæfni.
5. Ekki má nota klemmuna á vinstra ullinseyra sem er minna en 29 mm að breidd og 1,0 mm að þykkt.
6. Ekki má nota klemmuna á vinstra ullinseyra sem er stærra en 50 mm þegar ekki er þrýst á vefinn.
7. Ekki má nota þetta tæki ef sjúklingurinn er með næmi fyrir nikkeli (nikkel og títan málmblendi).

⚠ **VARÚÐARREGLUR**

1. Lesið allar leiðbeiningar fyrir AtriClip LAA-lokunarkerfið vandlega. Ef ekki er farið eftir leiðbeiningunum getur það leitt til þess að tækið virki ekki sem skyldi.
2. Eingöngu rétt þjálfað og hæft heilbrigðisstarfsfólk má nota tækið.
3. Athugið að það kunna að vera frávik í sérstökum aðgerðum vegna mismunandi aðferða lækna og líffærafræði sjúklinga.
4. Ekki láta tækið detta eða falla því slíkt getur skemmt tækið. Ekki má nota tækið ef það hefur dottið. Skiptið því út fyrir nýtt tæki.
5. Fargið tækinu og NOTIÐ ÞAÐ EKKI ef sæfðu umbúðirnar eru skemmdar eða ef sæfingarinnsigli hefur verið rofið.
6. MÁ EKKI SÆFA AFTUR. AtriClip LAA-lokunarkerfið er afhent sem SÆFÐ vara og er aðeins ætlað til notkunar í EITT skipti. Endursæfing getur valdið skertri virkni eða meiðslum hjá sjúklingi.
7. Íhugið vandlega og takið tillit til allra meðferða sem sjúklingurinn kann að hafa gengist undir fyrir skurðaðgerðina og veljið klemmustærð samkvæmt því. Geislameðferð fyrir aðgerð kann að leiða til vefjabreytinga. Þessar breytingar geta til dæmis valdið því að vefurinn þykknar yfir tilgreint bil fyrir valda klemmustærð.
8. Ekki má breyta tækinu. Notkun á breyttu tæki getur haft í för með sér ranga virkni þess. AtriCure, Inc. ber enga ábyrgð á né setur fram fullyrðingar um afköst þessarar vöru ef einhverjar breytingar hafa verið gerðar á AtriClip LAA-lokunarkerfinu.
9. Snúið ekki upp á eða beygið skaftið of mikið þar sem slíkt gæti haft áhrif á afköst tækis.
10. Fjarlægið blóðsega úr vinstra ullinseyra áður en klemman er sett á, eins og venjan er við aðrar skurðaðgerðir á stíflun í vinstra ullinseyra. Skurðlæknirinn skal meta hvort blóðsegi sé til staðar og ákveða meðferð í samræmi við hefðbundna meðferðarstaðla.
11. Staðsetjið og komið klemmunni fyrir þannig að hægt sé að fá góða yfirsýn yfir alla vefi sem á að vinna með. Léleg yfirsýn gæti haft í för með sér að staðsetningin sé ekki eins og best verður á kosið.
12. Gætið þess að koma sem minnst við vinstra ullinseyra og klemmuna eftir að klemman hefur verið sett á.
13. Mælt er með því að nota klemmuna á þurru svæði.
14. Ekki má nota klemmuna við hitastig undir 20 °C. Ef klemman er notuð við lægra hitastig en 20 °C getur það haft áhrif á afköst tækisins.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Skurðlæknir skal sjá um að meta og ákvarða hvaða klemmustærð hentar með aðstoð Gillinov-Cosgrove-valvísisins.

Val á klemmu

1. Notið Gillinov-Cosgrove-valvísinn til að ákvarða rétt val á Gillinov-Cosgrove LAA klemmu. Klemmustærðir eru gefnar upp á umbúðum tækisins og handfangi uppsetningarbúnaðarins.

Klemmustærð	Stærðarbil vinstra ullinseyra (breidd vinstra ullinseyra)
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. Fjarlægið AtriClip LAA-lokunarkerfið úr umbúðunum með smitgátaraðferð.
3. Hægt er að endurmóta mótanlega skaft AtriClip LAA-lokunarkerfisins til að auðvelda aðgengi að vinstra ullinseyra. Mótið skaft tækisins eins og þarf að halda með því að beita léttum þrýstingi.

⚠ ***Varúð:*** Ekki má halda um uppsetningarlykkjuna þegar skaftið er beygt til, það getur skemmt tækið. Beygið skaftið til með því að þrýsta varlega á það með báðum þumalfingrum. Ef skaftið er beygt of mikið eða snúið upp á það getur það haft áhrif á afköst tækisins. Ekki má reyna að snúa uppsetningarlykkjunni, það getur skemmt tækið.

4. Notið stimpilinn eða virkjunarstöngina á handfanginu til að opna og loka klemmunni varlega og tryggja rétta virkni.

⚠ ***Varúð:*** Ekki skal opna og loka klemmunni oftar en þrisvar sinnum með stimplinum eða virkjunarstönginni áður en hún er sett á.

Liðstýring endasvara- Gildir um LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 og LAAØ50.



5. Hægt er að liðstýra uppsetningarlykkju AtriClip LAA-lokunarkerfisins með höndunum úr 0° (innfelld mótun - eftir afhendingarformi) upp í ±90°, miðað við skaftið, til að hjálpa til við að koma Gillinov-Cosgrove LAA klemmunni fyrir á réttum stað út frá mismunandi líffærafræði sjúklinga.

Staðsetning klemmu

6. Færið AtriClip LAA-lokunarkerfið inn á markskurðsvæðið.
7. Opnið klemmuna varlega með því að færa virkjunarstöngina til baka eða ýta á stimpilinn.

ATHUGIÐ: Hægt er að læsa klemmunni í opinni stöðu með því að nota læsinguna á handfangi tækisins. Læsingin fer á þegar stöngin er virkjuð og hægt er að taka læsinguna af með því að færa stöngina varlega til vinstri. Gildir um LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 og LAAØ50.

ATHUGIÐ: Hægt er að læsa klemmunni í opinni stöðu með því að ýta á stimpilinn þangað til smellur heyrist og sleppa þá stimplinum. Til að aflæsa og loka klemmunni skal ýta stimplinum alla leið niður og sleppa honum hægt þar til klemman hefur lokast. Gildir um ACH135, ACH140, ACH145 og ACH150.

8. Snúið klemmubúnaðinum með forhlaðinni klemmu að enda vinstra ullinseyra þannig að lykkjurnar á endum klemmunnar vísi frá vinstra ullinseyra.



9. Staðsetjið klemmuna gætilega við botn vinstra ullinseyra.

10. Komið klemmunni fyrir þannig að hægt sé að fá góða yfirsýn yfir alla vefi sem á að vinna með.
11. Á meðan klemman er enn föst við uppsetningarbúnaðinn skal ganga úr skugga um að engin svæði umhverfis markvefinn séu fyrir eða geti skemmst af völdum klemmunnar og að klemman sé rétt staðsett.
12. Ef klemman er ekki rétt staðsett skal opna klemmuna gætilega og færa hana til eftir þörfum.

Uppsetning

13. Þegar klemmunni hefur verið komið rétt fyrir skal sleppa virkjunarstönginni eða stimplinum þannig að klemman lokist.
14. Setjið klemmuna upp með því að skera sauminn handvirkt á saumskurðarsvæðinu á stönginni eða handfanginu.



15. Setjið mótþrýsting á klemmuna og fjarlægið uppsetningarlykkjuna gætilega úr vinstra ullinseyra eins og sýnt er hér að neðan, þannig að klemman og festisaumurinn sitji eftir.

⚠ ***Varúð:*** Þegar búið er að skera sauminn handvirkt er ekki hægt að nota AtriClip LAA-lokunarkerfið til að fjarlægja klemmuna eða færa hana til.

16. Þegar klemmunni hefur verið komið fyrir skal fjarlægja festisaumana með því að toga þá varlega út, einn í senn, meðan mótþrýstingi er beitt á klemmuna eins og skurðlæknirinn mælir fyrir um. Ekki má skera efnið í klemmunni.



17. Fargið uppsetningarbúnaðinum eftir notkun. Fylgið staðbundnum gildandi reglugerðum og endurvinnsluáætlunum varðandi förgun eða endurvinnslu á íhlutum tækisins.

SKIL Á NOTUÐUM VÖRUM

Ef nauðsynlegt reynist af einhverjum ástæðum að skila þessari vöru til AtriCure, Inc. er RGA-númer (leyfisnúmer vegna vöruskila) frá AtriCure, Inc. áskilið áður en varan er send af stað.

Ef varan hefur komist í snertingu við blóð eða líkamsvessa skal hreinsa hana vandlega og sótthreinsa áður en henni er pakkað. Flytja skal vöruna annaðhvort í upprunalegri öskju eða samsvarandi umbúðum til að koma í veg fyrir skemmdir við flutning, varan skal enn fremur vera merkt með réttum hætti með RGA-númeri og ábendingu um lífsýnahættu.

Leiðbeiningar um þrif og áhöld, þ.m.t. viðeigandi flutningsílát, viðeigandi merkingar og RGA-númer má fá hjá AtriCure, Inc.

FULLYRÐINGAR UM FYRIRVARA

Notendur bera ábyrgð á því að samþykkja viðunandi ástand vörunnar áður en hún er tekin í notkun og að tryggja að varan sé aðeins notuð með þeim hætti sem lýst er í þessum notkunarleiðbeiningum, þar með talið, en takmarkast ekki við, að tryggja að varan sé ekki endurnotuð. AtriCure, Inc. mun ekki undir nokkrum kringumstæðum bera ábyrgð á nokkru tilfallandi, sérstöku eða afleiddu tapi, tjóni eða kostnaði sem leiðir af vísvitandi misnotkun eða endurnotkun á vörunni, þar með talið hvers kyns tap, tjón eða kostnaður í tengslum við heilsutjón eða skemmdir á eignum.

UPPLÝSINGAR UM MEÐHÖNDLUN: Gillinov-Cosgrove LAA klemma

Öryggisupplýsingar varðandi segulómun

⚠ **Skilyrt fyrir segulómun**

Forklínísk prófun sýndi að AOD1-klemman (hringlaga lokunartæki) er skilyrt fyrir segulómun. Hægt er að skanna sjúkling með þennan búnað á öruggan hátt í segulómunarkerfi um leið og honum hefur verið komið fyrir, ef eftirfarandi skilyrðum er mætt:

- Stöðugt segulsvið 1,5 Tesla og 3 Tesla, eingöngu
- Hámarks staðbundið stigulsvæði segulsviðs er 4.000 gauss/cm (40 T/m) (framreiknað) eða minna
- Hámarks segulómun á öllum líkamanum tilgreindi sértækan meðalhraða eðlisgleypni (SAR) 4 W/kg í 15 mínútna skönnun (þ.e. á púlsröð) í stýrðri fyrsta stigs notkunarstillingu fyrir segulómunarkerfið.
- Við þau skilyrði segulómunar sem skilgreind eru fyrir AOD1-klemmuna er búist við því að klemman hitni að hámarki um 2,9 °C eftir 15 mínútna samfellda skönnun (þ.e. á púlsröð).

Upplýsingar um galla

Í forklínískum prófunum var skekkja á mynd vegna AOD1-klemmunnar sem náði u.þ.b. 10 mm frá AOD1-klemmunni þegar myndað var með gradient bergmálsrunu og með 3 Tesla segulómunarkerfi.

it	ISTRUZIONI PER L'USO	ITALIANO

Sistema di esclusione AtriClip® LAA con clip Gillinov-Cosgrove® precaricata

DESCRIZIONE

Il sistema di esclusione AtriClip LAA è dotato di clip LAA Gillinov-Cosgrove (Clip) per la chiusura a cielo aperto dell'auricola atriale sinistra (LAA, Left Atrial Appendage) del cuore. La clip è precaricata su un applicatore di clip monouso. Il sistema di esclusione AtriClip LAA con Clip Gillinov-Cosgrove precaricata non contiene componenti di lattice di gomma naturale.

Sistema di esclusione AtriClip LAA ILLUSTRAZIONE E COMPONENTI

LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45, LAAØ50: AtriClip lungo[1]

1 Impugnatura	5 Asta malleabile	9 Anello di inserimento
2 Leva di attivazione	6 Uncino di snodo	10 Anello di inserimento snodabile
3 Area di taglio della sutura	7 Clip Gillinov-Cosgrove	
4 Cono con identificatore delle dimensioni della clip	8 Punti di ancoraggio della sutura	

ACH135, ACH140, ACH145, ACH150: AtriClip standard[2]
ACH235, ACH240, ACH245, ACH250 FLEX: AtriClip FLEX[3]

1 Stantuffo	4 Asta	7 Anello di inserimento
2 Impugnatura	5 Clip Gillinov-Cosgrove	8 Zona malleabile
3 Area di taglio della sutura	6 Punti di ancoraggio della sutura	

†Ogni manipolo AtriClip dispone di una regione a diversa malleabilità.
[1]L'asta del dispositivo AtriClip lungo è malleabile per l'intera lunghezza.
[2]La zona malleabile del dispositivo AtriClip standard è connotata da una serie di slot sull'asta in prossimità dell'anello di inserimento. Indicato esclusivamente per regolazioni minori nel piano laterale (sinistro/destro).
[3]L'asta del dispositivo AtriClip FLEX è malleabile per l'intera lunghezza. Indicato per regolazioni fino a 45° in tutti i piani.

⚠ **ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO DEL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI**

IMPORTANTE.

Questo opuscolo è stato progettato per semplificare l'utilizzo del prodotto e non è da intendersi come materiale di riferimento alla tecnica chirurgica.

INDICAZIONI PER L'USO

Il sistema di esclusione AtriClip LAA è indicato per la chiusura a cielo aperto dell'auricola atriale sinistra del cuore.

CONTROINDICAZIONI

1. Non usare come dispositivo per l'occlusione tubarica a scopo contraccettivo.
2. Non utilizzare il dispositivo su pazienti con allergia nota al Nitinol (lega di nichel-titanio).

All'impianto della clip non sono associati ulteriori rischi e/o effetti collaterali diversi da quelli normalmente associati agli interventi di chirurgia cardiaca.

⚠ **AVVERTENZE**

1. Dopo l'inserimento, non tentare di riposizionare o rimuovere la clip. Tali manovre possono danneggiare o lacerare i tessuti.
2. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto.
3. Non usare su tessuto che, a giudizio del chirurgo, non è in grado di tollerare materiali o tecniche di sutura convenzionali (come la suturazione meccanica).
4. Prima di inserire la clip, valutare attentamente il sito di posizionamento, lo spessore e l'ampiezza del tessuto. Per determinare la dimensione appropriata della clip, fare riferimento alle istruzioni per l'uso della guida alla selezione di Gillinov-Cosgrove. Nel caso in cui dimensioni e applicazione della clip non vengano valutate correttamente, si rischia di causare traumi tissutali, deiscenza, lacerazione dei tessuti, spostamento e/o mancanza dell'emostasi desiderata.
5. Non utilizzare su un'auricola atriale sinistra di ampiezza inferiore a 29 mm e spessore della parete inferiore a 1,0 mm.
6. Non utilizzare il dispositivo per auricole atriali sinistre superiori a 50 mm se il tessuto non è compresso.
7. Non utilizzare il dispositivo su pazienti con sensibilità al nichel (lega di nichel-titanio).

⚠ **PRECAUZIONI**

1. Leggere con attenzione le istruzioni del sistema di esclusione AtriClip LAA. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe compromettere il corretto funzionamento del dispositivo.
2. L'uso del dispositivo deve essere riservato a personale medico opportunamente addestrato e qualificato.
3. A causa di particolari esigenze della tecnica operatoria o delle caratteristiche anatomiche del paziente, possono essere necessarie specifiche variazioni procedurali.
4. Per evitare danni, non far cadere né scuotere il dispositivo. Se il dispositivo dovesse cadere, non utilizzarlo. Sostituirlo con uno nuovo.
5. Se la confezione sterile è danneggiata e/o la barriera sterile compromessa, eliminare il dispositivo e NON UTILIZZARLO.
6. NON RISTERILIZZARE. Il sistema di esclusione AtriClip LAA viene fornito STERILE ed è esclusivamente MONOUSO. La risterilizzazione può compromettere il funzionamento del dispositivo o causare lesioni al paziente.
7. Valutare attentamente ogni trattamento pre-chirurgico cui il paziente può essere stato sottoposto e selezionare la clip di misura adeguata. La radioterapia preoperatoria può provocare alterazioni del tessuto. Queste alterazioni possono, ad esempio, far sì che lo spessore del tessuto superi l'intervallo indicato per la dimensione della clip.
8. Non modificare il dispositivo. L'uso di un dispositivo modificato può compromettere il corretto funzionamento. In caso di modifiche al sistema di esclusione AtriClip LAA, AtriCure, Inc. non si assume alcuna responsabilità né fornisce garanzie circa le prestazioni del dispositivo.
9. Per non compromettere le prestazioni del dispositivo, non torcere né incurvare eccessivamente l'asta.
10. Prima di applicare la clip, estromettere il trombo dall'auricola atriale sinistra con altra tecnica chirurgica convenzionale ad hoc. La valutazione della presenza di trombi deve essere effettuata a discrezione del chirurgo e secondo lo standard di cura.
11. Posizionare e inserire la clip in modo da consentire la chiara visualizzazione di tutti i tessuti a cui si accede. Una visualizzazione scadente potrebbe risultare in un posizionamento non ottimale.
12. Dopo l'inserimento della clip, ridurre al minimo ogni manipolazione dell'auricola atriale sinistra e della stessa clip.
13. Si raccomanda di inserire la clip con il campo operatorio asciutto.
14. Non utilizzare la clip a temperature inferiori a 20 °C. L'applicazione della clip a temperature inferiori a 20 °C può compromettere le prestazioni del dispositivo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ogni scelta riguardante la dimensione della clip è affidata al giudizio del chirurgo, coadiuvato dalle indicazioni contenute nella guida alla selezione di Gillinov-Cosgrove.

SELEZIONE DELLA CLIP

1. Usare la Guida alla selezione di Gillinov-Cosgrove per scegliere la clip per LAA Gillinov-Cosgrove corretta. Le misure della clip sono indicate sia sulla confezione del dispositivo.

Dimensione della clip	Gamma di dimensioni dell'auricola atriale sinistra (larghezza dell'auricola atriale sinistra)
35 mm	29-35 mm
40 mm	34-40 mm
45 mm	39-45 mm
50 mm	44-50 mm

2. Estrarre il sistema di esclusione AtriClip LAA dalla confezione con tecnica sterile.
3. È possibile adattare l'asta malleabile del sistema di esclusione AtriClip LAA per accedere più facilmente all'auricola atriale sinistra. Applicare una leggera pressione per modellare lo stelo del dispositivo in base alle caratteristiche anatomiche.

⚠ ***Attenzione:*** non afferrare l'anello di inserimento per piegare l'asta; ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Piegare delicatamente facendo forza sotto entrambi i pollici. Una piega eccessiva dell'asta può influire sulle prestazioni del dispositivo. Non tentare di ruotare l'anello di inserimento; ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

4. Utilizzare lo stantuffo o la leva di attivazione sull'impugnatura per aprire e chiudere delicatamente la clip e verificare che funzioni correttamente.

⚠ ***Attenzione:*** non aprire e chiudere la clip per più di 3 volte utilizzando lo stantuffo o la leva di attivazione prima dell'inserimento.

Snodo della terminazione: applicabile ai modelli LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 e LAAØ50.



5. L'anello di inserimento del sistema di esclusione AtriClip LAA può essere manualmente snodato tra 0° (in linea, come fornito) e ± 90° rispetto all'asta per facilitare il corretto posizionamento della clip Gillinov-Cosgrove LAA in base alle caratteristiche anatomiche specifiche del paziente.

POSIZIONAMENTO DELLA CLIP

6. Manovrare il sistema di esclusione AtriClip LAA nel piano di dissezione del tessuto da trattare.
7. Aprire delicatamente la clip spostando la leva di attuazione all'indietro oppure premendo lo stantuffo.

NOTA: la clip può essere bloccata in posizione aperta per mezzo della funzione di blocco integrata nell'impugnatura del dispositivo. Il blocco si innesta quando si attiva la leva e può essere disinserito spostando delicatamente la leva a sinistra. Applicabile ai modelli LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 e LAAØ50.

NOTA: la clip può essere bloccata in posizione aperta premendo lo stantuffo fino a quando non si avverte un clic e rilasciando lo stantuffo. Per sbloccare e chiudere la clip, premere a fondo lo stantuffo e rilasciarlo lentamente fino a chiudere la clip. Applicabile ai modelli ACH135, ACH140, ACH145 e ACH150.

8. Orientare l'applicatore con la clip precaricata verso la punta dell'auricola atriale sinistra con gli anelli posti alle estremità della clip verso l'esterno dell'auricola atriale sinistra.



9. Posizionare delicatamente la clip alla base dell'auricola atriale sinistra.

10. Posizionare la clip in modo da avere una chiara visuale di tutti i tessuti a cui si ha necessità di accedere.
11. Mentre la clip è ancora nel dispositivo di inserimento, verificare che attorno al sito di inserimento non siano presenti altre strutture in grado di interferire con la clip o danneggiarla, e che questa venga posizionata correttamente.
12. Se la clip non è posizionata correttamente, aprirla con cautela e riposizionarla secondo necessità.

APPLICAZIONE

13. Appena la clip è stata posizionata correttamente, rilasciare la leva di attivazione o lo stantuffo e permettere alla clip di chiudersi.
14. Inserire la clip tagliando manualmente la sutura nell'area designata sulla leva o sull'impugnatura.



15. Applicando una contropressione alla clip, rimuovere delicatamente l'anello di inserimento dall'auricola atriale sinistra, come mostra la figura, lasciando la clip e la sutura di fissaggio sul retro.

⚠ ***Attenzione:*** dopo aver tagliato manualmente le suture, non è più possibile utilizzare il sistema di esclusione AtriClip LAA per riposizionare o rimuovere la clip.

16. Dopo aver inserito la clip, rimuovere le suture di fissaggio tirandole lentamente una alla volta ed esercitando una trazione opposta sulla clip, secondo quanto indicato dal chirurgo. Non tagliare il tessuto della clip.

17. Dopo l'uso, smaltire il dispositivo di inserimento. Attenersi alle disposizioni delle amministrazioni locali e smaltire o riciclare i componenti dell'unità in conformità alle disposizioni in materia.

RESTITUZIONE DEL PRODOTTO USATO

Se per una ragione qualunque è necessario restituire il prodotto ad AtriCure, Inc., prima della spedizione è necessario richiedere un numero di autorizzazione per la restituzione del prodotto (return goods authorization, RGA) ad AtriCure, Inc.

Se il prodotto è stato a contatto con sangue o liquidi corporei, prima di essere imballato deve essere pulito e disinfettato accuratamente. Spedire nell'imballaggio originale o in uno simile, per evitare danni durante la spedizione; deve inoltre essere correttamente provvisto di etichetta con l'indicazione del numero di RGA e della natura a rischio biologico del contenuto della spedizione.

Da AtriCure, Inc. è possibile ottenere istruzioni per la pulizia e i materiali, compresi contenitori appropriati per la spedizione, etichette corrette e un numero di RGA.

DICHIARAZIONI LIBERATORIE

L'utente si assume la responsabilità di verificare che le condizioni di questo prodotto siano accettabili prima del suo utilizzo e di assicurare che il prodotto venga utilizzato solo nel modo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso, tra cui, a titolo esemplificativo, assicurare che il prodotto non venga riutilizzato. In nessuna circostanza AtriCure, Inc. verrà ritenuta responsabile di qualsiasi perdita, danno o spesa accidentale, speciale o consequenziale, che sia il risultato di un uso improprio o del riutilizzo deliberato di questo prodotto, tra cui eventuali danni, perdite o spese che siano correlati a lesioni personali o danni alla proprietà.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI: CLIP LAA GILLINOV-COSGROVE

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA PER RM

⚠ **A COMPATIBILITÀ RM CONDIZIONATA**

Test non clinici hanno dimostrato che la clip AOD1 (Annular Occlusion Device [Dispositivo di occlusione anulare]) è a compatibilità RM condizionata. Un paziente con questo dispositivo può essere sottoposto in sicurezza a procedura con risonanza magnetica immediatamente dopo il posizionamento nelle seguenti condizioni:

- Solo campo magnetico statico di 1,5 Tesla e 3 Tesla
- Gradiente spaziale massimo del campo magnetico di 4.000 gauss/cm (40 T/m) (estrapolato) o inferiore
- Massimo tasso di assorbimento specifico (SAR) mediato su tutto il corpo di 4 W/kg per 15 minuti di scansione (ossia per sequenza a impulsi) nella modalità operativa controllata di primo livello del sistema RM
- Nelle condizioni di scansione definite è previsto che la clip AOD1 produca un aumento di temperatura massimo di 2,9 °C dopo 15 minuti di scansione continua (ossia, per sequenza di impulsi)

INFORMAZIONI SUGLI ARTEFATTI

In test non clinici, l'artefatto di immagine causato dalla clip AOD1 si estende all'incirca di 10 mm dalla clip AOD1 quando si usa una sequenza di impulsi gradient echo e un sistema RM a 3 Tesla.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI SULL'ETICHETTA DELLA CONFEZIONE

Consultare la confezione esterna per determinare quali simboli si applicano al dispositivo.

lt	Naudojimo instrukcija	LIETUVIŲ K.

„AtriClip® LAA Exclusion System" su iš anksto įdėtu „Gillinov-Cosgrove® Clip"

APRAŠAS

Sistemoje „AtriClip LAA Exclusion System" naudojamas „Gillinov-Cosgrove LAA Clip" (spaustukas) kairiojo prieširdžio ausytės (LAS) atvirajai okliuzijai. Spaustukas iš anksto įdėtas į vienkartinį spaustuko taikymo įtaisą. „AtriClip LAA Exclusion System" su iš anksto įdėtu „Gillinov-Cosgrove Clip" sudėtyje nėra komponentų iš natūralaus kaučiuko.

„AtriClip LAA Exclusion System" ILIUSTRACIJA IR SUDEDAMOSIOS DALYS

(LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45, LAAØ50) – ilgas „AtriClip"[1]

1 Rankena	5 Plastiškas antgalis	9 Uždėjimo kilpa
2 Suaktyvinimo svirtelė	6 Lanksto šakutė	10 Lankstinė uždėjimo kilpa
3 Chirurginių siūlų nupjovimo zona	7 „Gillinov-Cosgrove Clip"	
4 Viršūnės kūgis su spaustuko dydžio identifikatoriumi	8 Chirurginių siūlų inkarai	

(ACH135, ACH140, ACH145, ACH150) – standartinis „AtriClip"[2]
(ACH235, ACH240, ACH245, ACH250) FLEX – „AtriClip FLEX"[3]

1 Stūmoklis	4 Kotas	7 Uždėjimo kilpa
2 Rankena	5 „Gillinov-Cosgrove Clip"	8 Plastiška zona†
3 Chirurginių siūlų nupjovimo zona	6 Chirurginių siūlų inkarai	

† Kiekvieno „AtriClip" kotelio plastiška sritis skiriasi.
[1] Visas ilgo prietaiso „AtriClip" kotas yra plastiškas.
[2] Standartinio prietaiso „AtriClip" plastiška zona pažymėta ant koto esančiomis išpjovomis arti uždėjimo kilpos. Ji skirta tik nežymiai reguliuoti šoninėje plokštumoje (į kairę / į dešinę).
[3] Visas prietaiso „AtriClip FLEX" kotas yra plastiškas. Jis skirtas reguliuoti iki 45° kampu visose plokštumose.

⚠ **DĖMESIO. PRIEŠ NAUDODAMI GAMINĮ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE TOLIAU PATEIKTĄ INFORMACIJĄ**

SVARBU!

Šio leidinio paskirtis – padėti naudoti gaminį. Jis nėra chirurginių metodų žinynas.

INDIKACIJOS

Sistema „AtriClip LAA Exclusion System" skirta kairiojo prieširdžio ausytės atvirajai okliuzijai.

KONTRAINDIKACIJOS

1. Prietaiso nenaudokite kaip kontraceptinės kiaušintakių okliuzijos priemonės.
2. Prietaiso nenaudokite, jeigu žinoma, kad pacientas alergiškas nitinoliui (nikelio ir titano lydiniui).

Nėra jokių papildomų su spaustuko implantavimu susijusių pavojų ir (arba) šalutinio poveikio, išskyrus su širdies chirurginėmis procedūromis susijusius įprastinius pavojus ir šalutinį poveikį.

⚠ **ĮSPĖJIMAI**

1. **Uždėto spaustuko nemėginkite perkelti į kitą vietą arba nuimti, nes antraip gali būti pažeisti arba įplėšti audiniai.**
2. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
3. Nenaudokite ant audinio, kuris, chirurgo nuomone, neatlaikytų įprastinių chirurginių siūlų medžiagų arba įprastinių uždarymo metodikų (pavyzdžiui, sukabinimo chirurginėmis sankabomis).
4. Prieš uždėdami spaustuką atidžiai įvertinkite spaustuko padėtį, audinių storį ir plotį. Kaip nustatyti tinkamą spaustuko dydį, žr. „Gillinov-Cosgrove Selection Guide" naudojimo instrukciją. Tinkamai nenustačius spaustuko dydžio arba tinkamai neuždėjus spaustuko gali pasireikšti audinių trauma, dehiscencija, būti įplėšti arba pasislinkti audiniai ir (arba) nebūti pasiekta reikiama hemostazė.
5. Nenaudokite ant LAA, kurios plotis mažesnis kaip 29 mm, o sienelės storis – 1,0 mm.
6. Nenaudokite ant LAA, kuri nesuspaudus audinių didesnė kaip 50 mm.
7. Prietaiso nenaudokite, jeigu žinoma apie padidėjusį paciento jautrumą nikeliui (nikelio ir titano lydiniui).

⚠ **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

1. Atidžiai perskaitykite visas „AtriClip LAA Exclusion System" instrukcijas. Tinkamai nesilaikant instrukcijų prietaisas gali veikti netinkamai.
2. Prietaisą naudoti turi tik tinkamai išmokytas ir kvalifikuotas medicinos personalas.
3. Pažymėtina, kad dėl kiekvieno gydytojo taikomų metodikų ir paciento anatomijos ypatumų konkrečios procedūros gali šiek tiek skirtis.
4. Prietaiso nenumeskite ir nemėtykite, nes antraip jis gali būti sugadintas. Jeigu prietaisas nukrito, jo nenaudokite. Pakeiskite nauju prietaisu.
5. Jeigu pažeista sterili pakuotė ir (arba) pažeistas sterilus barjeras, prietaisą išmeskite ir jo NENAUDOKITE.
6. NESTERILIZUOKITE PAKARTOTINAI. „AtriClip LAA Exclusion System" tiekiama STERILI ir skirta naudoti tik VIENĄ KARTĄ. Pakartotinai sterilizuojant gali nustoti veikti prietaisas arba būti sužeistas pacientas.
7. Atidžiai išnagrinėkite visas ankstesnes pacientui atliktas chirurgines procedūras, nes nuo jų taip pat gali priklausyti spaustuko dydžio parinkimas. Dėl priešoperacinės spindulinės terapijos gali būti audinių pokyčių, pavyzdžiui, audinio storis gali viršyti nurodytą intervalą, tinkamą pasirinkto dydžio spaustukui.
8. Šio prietaiso nemodifikuokite. Modifikuotas prietaisas gali veikti netinkamai. Jeigu „AtriClip LAA Exclusion System" buvo bet kokiu būdu modifikuota, „AtriCure, Inc." neužtikrina ir negarantuoja gaminio veikimo savybių.
9. Koto nesusukite ir pernelyg nesulenkite, nes antraip gali prasčiau veikti prietaisas.
10. Kaip ir taikydami kitus įprastinius LAA okliuzijos chirurginius metodus, prieš uždėdami spaustuką iš LAA pašalinkite trombus. Trombų buvimas turėtų būti įvertintas chirurgo nuožiūra ir pagal priežiūros standartą.
11. Spaustuko padėtį nustatykite ir jį uždėkite taip, kad galėtumėte aiškiai matyti visus pasiekiamus audinius. Esant prastam matomumui spaustukas gali būti uždėtas ne taip kokybiškai, kaip reikėtų.
12. Uždėję spaustuką stenkitės kuo mažiau manipuliuoti LAA ir spaustuku.
13. Rekomenduojama spaustuką uždėti sausame lauke.
14. Spaustuko nenaudokite žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje. Žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje dedant spaustuką gali prasčiau veikti prietaisas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dedamo spaustuko dydis nustatomas chirurgo sprendimu, kaip pagalbinę priemonę naudojant „Gillinov-Cosgrove Selection Guide".

Spaustuko parinkimas

1. Naudodami „Gillinov-Cosgrove Selection Guide" parinkite tinkamą „Gillinov-Cosgrove LAA Clip" dydį. Spaustukų dydžiai nurodyti ant prietaiso pakuotės ir uždėjimo prietaiso rankenos.

Spaustuko dydis	LAA dydžio intervalas (LAA plotis)
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. Steriliu būdu išimkite „AtriClip LAA Exclusion System" iš pakuotės.
3. Kad būtų lengviau pasiekti LAA, galima keisti „AtriClip LAA Exclusion System" plastiško koto formą. Nestipriai spausdami prietaiso kotą, pagal anatominius ypatumus suteikite jam reikiamą formą.

⚠ **Dėmesio.** Kotui sulenkti netraukite uždėjimo kilpos, nes antraip gali būti sugadintas prietaisas. Sulenkite atsargiai sutelkdami jėgą po abiem nykščiais. Pernelyg sulenkus arba susukus kotą gali prasčiau veikti prietaisas. Nemėginkite sukioti uždėjimo kilpos, nes antraip prietaisas gali būti sugadintas.

4. Rankenoje esančiu stūmokliu arba suaktyvinimo svirtimi atsargiai atidarykite ir uždarykite spaustuką, taip įsitikindami, kad jis tinkamai veikia.

⚠ **Dėmesio.** Prieš uždėdami spaustuką stūmokliu aktyvinimo svirtele atidarykite ir uždarykite ne daugiau kaip 3 kartus.

Galinio efektoriaus lankstinis judėjimas – taikoma LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 ir LAAØ50.



5. „AtriClip LAA Exclusion System" uždėjimo kilpos lanksto mechanizmą galima rankiniu būdu nustatyti nuo 0 ° (tiesi padėtis, prietaisas pristatomas nustatytas šiuo būdu) iki ± 90 ° kampu koto atžvilgiu, kad galėtumėte lengviau uždėti „Gillinov-Cosgrove LAA Clip", atsižvelgdami į paciento anatomijos skirtumus.

Spaustuko padėties nustatymas

6. Perkelkite „AtriClip LAA Exclusion System" į reikiamą pjūvio plokštumą.
7. Patraukdami suaktyvinimo svirtelę atgal arba nuspausdami stūmoklį atsargiai atidarykite spaustuką.

PASTABA. Atidarytą spaustuką galima užfiksuoti prietaiso rankenoje esančiu fiksatoriumi. Fiksatorius įjungiamas pajudinus svirtelę ir gali būti atleidžiamas švelniai pajudinus svirtelę į kairę. Taikoma LAAØ35, LAAØ40, LAAØ45 ir LAAØ50.

PASTABA. Spaustuką galima užfiksuoti atidarytą, nuspaudžiant stūmoklį, kol pasigirs spragtelėjimas, tada atleidžiant stūmoklį. Kad atfiksuotumėte ir uždarytumėte spaustuką, iki galo nuspauskite stūmoklį, tada jį lėtai atleiskite, kol spaustukas užsidarys. Taikoma ACH135, ACH140, ACH145 ir ACH150.

8. Spaustuko taikymo įtaisą su iš anksto įdėtu spaustuku sulygiuokite su LAA viršūne, spaustuko galus nukreipę tolyn nuo LAA.



9. Atsargiai nustatykite spaustuką ties LAA pagrindu.

10. Spaustuko padėtį nustatykite taip, kad galėtumėte aiškiai matyti visus pasiekiamus audinius.
11. Kol spaustukas tebėra uždėjimo įtaise, įsitikinkite, kad jokios aplinkinės struktūros netrukdo spaustukui ir nėra jo pažeidžiamos, o spaustukas tinkamai nustatytas.
12. Jeigu spaustukas nėra tinkamai nustatytas, atsargiai jį atidarykite ir pakartotinai nustatykite jo padėtį.

Uždėjimas

13. Nustatę tinkamą spaustuko padėtį atleiskite suaktyvinimo svirtelę arba stūmoklį, kad spaustukas užsidarytų.
14. Ant svirtelės arba rankenos pažymėtoje nupjovimo zonoje rankiniu būdu nupjaudami chirurginį siūlą uždėkite spaustuką.



15. Kaip vaizduojama paveiksle, sudarydami spaustuko priešinį slėgį nuo LAA atsargiai nuimkite uždėjimo kilpą, palikdami spaustuką ir tvirtinimo siūlą.

⚠ **Dėmesio.** Rankiniu būdu perpjovus chirurginius siūlus „AtriClip LAA Exclusion System" nebegalima naudoti spaustuko padėčiai pakeisti ar jam nuimti.

16. Uždėję spaustuką nuimkite tvirtinimo chirurginius siūlus, chirurgo nuožiūra atsargiai juos po vieną traukdami, tuo pat metu traukdami spaustuką priešinga kryptimi. Nepjaukite spaustuko audinio.

AtriCure



17. Panaudoję uždėjimo įtaisą išmetde. Lakyklės vertinę valdžios institucijų pokalbių ir protokolinės planų nuostatų dėl pirkiamo komponento išmetimo ar perdirbimo.

PAKAUDOTO GAMINIO GRĄŽINIMAS

Jeigu dėl bet kokios priežasties gamintojas ir/arba jo grupės bendrovė „AtriCure, Inc." prieš išsiunčiant naują ir/arba bendrovės „AtriCure, Inc." gauti perkų įsigijimo galiojimo (PĮG) numerį.

Jeigu gamintoj bet kuriuo ar kone okeo čia, prieš pakuojant į ankšą kvapūčiai naudoti ir išdezinfekuoti. Kad gydytoms gamintojo nebūtų suspėtamas, jį reikia išsiųsti originalioje arba tokioje pat dėžutėje, ant kuros turi būti trinkamas uždėjęs PĮG numeris ir nurodyta, kad siunta yra biologiškai pavojinga.

Nurodymų dėl užpyno ir metilinę, jakatant trinkamas gydomas tabpykles, trinkamą ženklinimą ir PĮG numerę, galima gauti iš „AtriCure, Inc."

PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS NEPRISIĖMIMO

JE Sam gamintoj pateiktos užpyno ir/arba gamintojamą prieš pradedant naudoti ir uždėnimą, kad gamintoj būtų naudojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu būdu, jakatant uždėnimą, kad gamintoj neblogai naudojamas pakartotinai, taičiau tas neapdorotas, nuplautas, sterilizuotas ir patikrintas ar pakartotinai naudojant tj gamintoj, jakatant bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, sedjenas su žmonių sužeidimu ar nuosavybės sugadinimu.

DARBO INFORMACIJA: „Gillino-Cosgrove LAA Clip"

NRT vaogos informacija

⚠ **Sąlyginai saugos MR aplinkoje**

Neklininiam tyrimuose nustatyta, kad AD01 (žiedinė oklusijos priemonė) sąsaitukas yra sąlyginiai saugus MR aplinkoje. Pacientą, kuriam ką tik įdėta ši priemonė, saugo tos MR sąlygos, jei sekimasi šių sąlygų:

- 0& 1,5 tesla arba 3 tesla statinio magnetinio lauko;
- didžiausias erdinens gradiento magnetinis laukas — ne didesnis kaip 4000 gauss/cm (40 T/m) (eksteriopolinis arba mažesnis);
- didžiausia MR sistemos reginimuo eto kūno vidutiniai sąsaitosio energijos suaptos (SAR) 4 W/kg per 15 minučių (skenavimo 0, y. per impulsų seką). MR sistemai veikiant pirmoje lygio kontroliuojamo darbinio režimo, pirmiau nurodytomis sąlygomis sąsaitosio AD01 sąsaitosio numatomas didžiausias temperatūros padidėjimas po 15 minučių nepertraukiamo skenavimo (pavyzdžiui, per impulsų seką) neviršija 2,5 °C.

Informacija apie artefaktus

Neklininiuose tyrimuos nustatyta, AD01 sąsaitukas sukeliamas vaizdo artefaktas tęsiasi maždaug 10 mm nuo AD01 sąsaitko gradiento aido impulsų seką taisomu. Šai skenavimo 3 T MR sistema.

lv — Lietošanas norādījumi — LATVIEŠU

AtriClip™ LAA izslēgšanas sistēma ar iepriekš ielādētu Gillino-Cosgrove™ klipu

APRAKSTS

AtriClip LAA izslēgšanas sistēma ir ieveris Gillino-Cosgrove LAA klips (klips), kas paredzēts sirds kreisā priekškambara piedēkļa (LAA) saitēja oklūzijai. Klips ir iepriekš ielādēts veemestīgs lietošanas klipu ieveris. AtriClip LAA izslēgšanas sistēma ar iepriekš ielādētu Gillino-Cosgrove klipu nesatur dabiskā kautiņa lateksa komponentu.

AtriClip LAA izslēgšanas sistēma ATTĒLI UN NOMENKLATŪRA

(LAA820, LAA840, LAA860, LAA820 — AtriClip jaunā)

1	Rokturis	5	Formētājmā vāciņš	9	Izvietošanas cilpa
2	Aktivācijas svira	6	Artikulācijas aptauja	10	Artikulēta izvietošanas cilpa
3	Sanja ģeometrisa zona	7	Gillino-Cosgrove klips		
4	Drgsana konus ar klipu izmēru identifikācija	8	Šauja enkur		

(AC4125, AC4140, AC4160, AC4150 — AtriClip standarta/
(AC4225, AC4240, AC4260, AC4250) FLEX — AtriClip FLEX)

1	Virzulis	4	Vāpsta	7	Izvietošanas cilpa
2	Rokturis	5	Gillino-Cosgrove klips	8	Formējamā zona 1
3	Šauja ģeometrisa zona	6	Šauja enkur		

1 Katurm AtriClip okurm ir atšķirīgs formējamais laukums.
Šo laukumu var izmantot, lai noteiktos apstākļos ieņemtu formēšanu.
AtriClip standarta ierīces formējamais zonu apzīmē ar vienu kopu ar vāciņiem.
Šo formējamā zona ir atzīmēta ar vienu kopu ar vāciņiem.

⚠ **Izmantojot!** Pirms izvietošanas noņemiet un noņemiet ārējo ar vīciņi un aizvāciņu sanja vārsti nākā 3 reizes.

Ārsti Effector ārkārtīgajā — attiecas uz LAA820, LAA840, LAA860 un LAA820.

2. Izaui kei AtriClip LAA-exclusieystem met het gebruik van een steriele technisch set de verpakking.
3. De buigzame schacht van het AtriClip LAA-exclusieystem laat wonden verworvel om tegoed tot het LAA te vergemakkelijken. Gelten lichte druk ait om de schacht van het apparaat te vermeen op basis van anatomische kruisies.

⚠ **Uzmanībai!** Noņemiet ietvertnes cilpu, lai saliktu vārstu, ja tai ar izraisīt ārēju bojājumu. Lietot, veikt korektnēji spēju zem ādam ādjem. Ja tas nebūtu darīts, ierīce var nedarboties vai radīsies vēlākie ādas bojājumi.

4. Izmantojot vīcuā ar aktivācijas sviru, kas atrodas uz vārsta, samaziet ar aversmi kā ādjem, lai palielinātu par pamies ādjem.

⚠ **Uzmanībai!** Pirms izvietošanas noņemiet un noņemiet ārējo ar vīciņi un aizvāciņu sanja vārsti nākā 3 reizes.

Ārsti Effector ārkārtīgajā — attiecas uz LAA820, LAA840, LAA860 un LAA820.

5. AtriClip LAA izslēgšanas sistēma izvietošanas cilpu var manuāli ietvērt no 5° (ieteicamā pozīcija) līdz ± 90° attiecībā pret sānsēju, lai palīdzētu pareizi novietot Gillino-Cosgrove LAA klipu, ņemot vērā anatomiju.

Cilpas novietošana

1. Izmantojot AtriClip LAA izslēgšanas sistēmu melka dzīvdzīgie ādjem.
Vēlgi aizvert klipu, virzot aktivācijas sviru uz aizmuguri vai nospiežot vīciņu.
PIEZĪME. Klips var noņemt ārējais vāciņš, izmantojot bīdāmās forceps ceļa ādas.
Fiksēsim nobīdāsim, kad sviru ir aktivēta, un tai var atkārtoti vērt ādjem.
PIEZĪME. Klips var noņemt ārējais vāciņš, nospiežot vīciņā lūk ādjem un atsāc virzuli. Lai atbīdītu un aizvērtu klipu, pēdējā nospiežot virzuli un tādam ādjem, kāds tas ir aizvērts. Attēsu ādjem AC4125, AC4140 un AC4150.
2. Ūtentāpt klipu ievietošai ar vēpnēji ādjēdīts klipu LAA ta, lai cilpa klipu būtu vēstas vīciņai tam pretī.



3. Izmaņu novietojiet klipu LAA pamatne.

4. Šo platnīšu sari AtriClip LAA-exclusieystem kan handmatig van 0° (inline – zuals gelieverd) tot ± 90° ten opzichte van de schacht wonden gebogen om zeer juiste plaatsing van de Gillino-Cosgrove LAA-clip te ondersteunen en in te spelen op variaties in de spieren op variaties in de anatomie van de patiënt.

POSITIONERING ELEM

6. Manoeuvreer het AtriClip LAA-exclusieystem in het beoogde discstenlak.
7. Open de klem voorzichtig door de actieverpindel naar achteren te bewegen of de plunjer in te drukken.

OPMERKING: De klem kan dan in de open positie worden vergrendeld door de vergrendelknop van de actieverpindel terug naar de beginstand te duwen. De vergrendeling sluit wanneer de hendel wordt geactiveerd en kan worden gropend door de hendel voorzichtig naar links te bewegen. Van toepassing op LAA820, LAA840, LAA860 en LAA820.

OPMERKING: De klem kan in de open positie worden vergrendeld door de plunjer in te drukken tot deze vastklikt en de plunjer los te laten. U kunt de klem aangepaste en nauwkeurige plaatsing van de Gillino-Cosgrove LAA-clip ondersteunen door de plunjer voorzichtig te bewegen van AC4125, AC4140, AC4160, AC4150.

8. Ontdenner de klemgeweer met voorgeladen klem aan de part van het LAA met de lassen aan de uiteinden van de klem weg wijzend van het LAA.

9. Nooitmeer de klem voorzichtig bij de basis van het LAA.

10. Positioneer de klem zodanig dat alle weefsels die worden beharkdend goed zichtbaar zijn.
11. Controleer terwijl de klem nog aan het plantaarm bevestigd is of er embiggende structuren zijn die de klem belemmeren of eroder beschadigd zijn, en of de klem juist gepaast is.
12. Als de klem niet juist gepaast is, opent u de klem voorzichtig en positioneer u deze opnieuw naar behoefte.

PLAATSING

13. Als de klem goed gepaast is, kunt u de actieverpindel of plunjer langzaam loslaten om de klem te sluiten.
14. Plaats de klem door de hechtbaan bij de daarvoor bestemde uitkeppelstaf op de hendel of het handvat handmatig door te knijpen.

15. Verwijder, terwijl u tegendruk op de klem uitoefent, de plaatsingslus voorzichtig uit het LAA. Laat hierbij de klem en beveiligingshechtband achter.

16. Verwijder, terwijl u tegendruk op de klem uitoefent, de plaatsingslus voorzichtig uit het LAA. Laat hierbij de klem en beveiligingshechtband achter.

17. Wee het plaatsingslusinstrument na gebruik weg. Volg de plaatselijk geldende voorschriften en recyclingprocedures van hetzelfde bedrijf.

GEBRUIKTE PRODUCTEN RETOURNEREN

Als dit product om enige reden aan AtriCure, Inc. moet worden geretourneerd, moet voorafgaand aan de verzending van AtriCure, Inc. een retoucoretoestemmenner (retum goods authorization, RGA) worden verkregen.
Als het product in contact is geweest met bloed of lichaamsvloeistoffen, dient het vóór verpakking grondig gereinigd en gedesinfecteerd te worden. Het dient verzonden te worden in elkaar de originele verpakking schoof een vergelijkbare verpakking, om beschadiging tijdens transport te voorkomen; ook dient het juist gelabeld te worden met een RGA-nummer en een indicatie van de biogevaarlijke aard van de producten van de verpakking.
Instructies voor reinigingen en materialen, met inbegrip van geschikte verzendingsverpakkingen, jaiste etikettering en een RGA-nummer, kunnen worden verkregen bij AtriCure, Inc.

VRUIMBORINGSVERKLARING

Gebruikers nemen de verantwoordelijkheid op zich om voorafgaand aan het gebruik de aanvaardbaar staat van dit product goed te keuren en om ervoor te zorgen dat het product uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing beschreven wijze wordt gebruikt en niet opnieuw wordt gebruikt. AtriCure, Inc. is in geen geval verantwoordelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade, schade of kosten die het gevolg zijn van oportelijk misbruik of hergebruik van dit product, met inbegrip van verlies, schade of kosten die verband houden met lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.

MANTERINGSINFORMATIE: GILLINOV-COSGROVE LAA-CLIEMEN

MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE

⚠ **MR-VOORWAARDELIJK**

Niet-klinische tests hebben aangetoond dat de AD01-klem (Atrosular Occlusion Device, rinpromnig hulpmiddel voor oscluisie) onder voorwaarden MR-veilig is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan veiligheidshalve in plaatsing van het hulpmiddel onder de volgende voorwaarden veilig in een MR-systeem worden gezocht:

- Statisch magneetveld van uitsluitend 1,5 tesla of 3 tesla
- Maximale ruimtelijke gradient van het magneetveld van 4000 gauss/cm (40 T/m) (geïntrapolineerd) of minder
- Maximale door MR-systeem geraapportteerde geneldelde specifieke absorptiesnelheid (SAR) voor het hele lichaam van 4 W/kg gedurende 15 minuten scanned (d.w.z. per pulssequentie) of de eerstegraads geïnstrolleerde bedrijfsmodus van het MR-systeem
- Er wordt verwacht dat de AD01-klem een maximale temperatuurstijging van 2,5 °C produceert na 15 minuten ongehoorden scanen (dat wil zeggen, per pulssequentie)

ARTEFACTINFORMATIE

Wegens niet-klinische tests weet men dat artefacten van de AD01-klem van ongeveer 10 mm buiten de AD01-klem vrezenzacht bij beeldvorming met een gradiënt-echo pulssequentie en een 3 tesla MR-systeem.

VERKLARING VAN SYMBOLEN OP VERPAKKINGSETIKETTEN

Raadpleeg het etiket op de buitenverpakking om te controleren welke symbolen van toepassing zijn op dit product.

no — BRUKSANVISNING — NORSK

AtriClip™ LAA-ekskluderingssystem med forhåndslastet Gillino-Cosgrove™-klemme

BESKRIVELSE

AtriClip LAA-ekskluderingssystemet inneholder Gillino-Cosgrove LAA-klemmen (klipp) for åpen okklusjon av hjertets venstre aurikkel (LAA). Klemmen er forhåndslastet og er en engangs klemmeapparillkor. AtriClip LAA-ekskluderingssystem med forhåndslastet Gillino-Cosgrove-klemme inneholder ikke komponenter av naturgummilateks.

ILLUSTRASJONER OG NOMENKLATUR for AtriClip LAA-ekskluderingssystem

LAA820, LAA840, LAA860, LAA820 — Sanja AtriClip™

1	Håndtak	5	Formbart skaft	9	Utplasseringsslyngfe
2	Aktiveringsspak	6	Clevis-gisme for artikulasjon	10	Utplasseringsslyngfed med artikulasjon
3	Sutaksjlyspenne	7	Gillino-Cosgrove klemme		
4	Nerekonus med klemmestørrelsesindikator	8	Sutaksjlyspenne		

AC4125, AC4140, AC4160, AC4150 – AtriClip Standard
AC4225, AC4240, AC4260, AC4250 FLEX – AtriClip FLEX™

1	Stempel	4	Skaft	7	Utplasseringsslyngfe
2	Håndtak	5	Gillino-Cosgrove klemme	8	Formbar sonar1
3	Sutaksjlyspenne	6	Sutaksjlyspenne		

1 Hvert AtriClip-håndtak har forskjellig formbart areale.
Dette kan brukes til å gjøre AtriClip-enhetens skaft et formbar.
Dette formbare arealet er merket med et mønster som er betegnet med et sett med spor på skaftet som utplasseringsslyngfen. Det er ikke beregnet for mindre justeringer av klemmen som kan gjøres med AtriClip-enhetens skaft et formbar.
Ved bruk av et formbart skaft gjøres det forsøk på å bøye det formbare arealet i et sett med spor på skaftet som utplasseringsslyngfen er sammenlignbar med en bøyende sonar.
Ved bruk av et formbart skaft kan det ikke gjøres justeringer av klemmen.

⚠ **FORSIKTIG: UTS FORBEHOLDE INFORMASJON NØYE FØR DU BRUKER PRODUKTET**

VIKTIG!

Dette hefter er designet for å hjelpe deg med å bruke dette produktet. Det er ikke en henvisning til kirurgisk teknikker.

BRUKSINDIKASJON

AtriClip LAA-ekskluderingssystemet er indikert for åpen okklusjon av hjertets venstre aurikkel.

KONTRAINDIKASJONER

1. Ikke bruk denne enheten som prevensjonsmiddelmedet emnet.
2. Ikke bruk denne enheten hvis pasienten har en kjent allergi mot sutinol (nikkel-titaningreep).

Ser i tegnes ekstra risikoer og ville bivirkninger forbundet med implantasjon av klemmen, annet enn de som vanligvis er forbundet med hjertekirurgisk prosedyre.

⚠ **PRESTERSKAP: FØRER UTSTEDER PRODUKTET NALEGGY DOKLADNEJ PRZECYTAĆ POWIĘZSE INFORMACJE**

WARNING

Bimeiqsa brocuvra zvolta yeraqsuva y mnoly o ulaiwenia kuryczana z tego produktu. Nie jest to sterilizacji ulaiwenia, ale ten element gwoliłem u, mag bet nie ulaiwenia.

DOKŁADNE DESTYNOWANIA

System okłuąj LAA AtriClip jest przeznaczony do okłuąj auzka lewego przedsionka serca.

PRZECIWWSKAZANIA

1. Nie stosować tego urządzenia jako urządzenia antykoncepcyjnego do okłuąj jajowodów.
2. Nie należy używać tego urządzenia, jeśli pacjent ma rozpoznaną alergię na Nitinol (stop nikiu i tytanu).

OSTRZEŻENIA: ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INFORMAÇÕES

Este folheto foi concebido para ajudar a utilizar este produto. Não se trata de uma referência para técnicas cirúrgicas.

INDICAÇÕES

Sistema de exclusão de LAA AtriClip é indicado para a oclusão aberta do apêndice auricular esquerdo do coração.

CONTRAINDICAÇÕES

1. Não utilizar este dispositivo como dispositivo de oclusão tubárica contraceptiva.
2. Não utilizar este dispositivo se o paciente tiver uma alergia conhecida ao nitinol (liga de níquel e titânio).

Considerar os riscos e efeitos secundários associados à implantação da liga de níquel-titânio para um não normalmente associado aos procedimentos cirúrgicos cardíacos.

⚠ **AVISOS**

1. Não tente reprocessar nem retrabalhar o Clip depois de colocado. Poderá danificar ou causar os bezelos.
2. Utilize este dispositivo apenas para o fim a que se destina.

Não utilizar este bezelos que, na opinião do cirurgião, tenha sofrido danos ou tenha sido manipulado de forma inadequada (tal como a aplicação de angulação cirúrgica).

Avaliar cuidadosamente a posição do Clip, a espessura dos tecidos e a largura de tecido antes da colocação do Clip. Para determinar a tamanho do Clip apropriado, consulte as Instruções de Utilização no Guia de Seleção Gillino-Cosgrove. Um tamanho do Clip incorrecto ou uma má colocação do Clip podem levar a oclusões incompletas, deixando tecido não oclusivo, ou a uma oclusão da hemostasia desejada.

Não utilizar um LAA com menos de 29 mm de largura e 1,0 mm de espessura de parede.

Não utilizar num LAA com um tamanho superior a 50 mm quando o tecido não está comprimido.

Não utilizar este dispositivo se o paciente tiver sensibilidade ao nóquel (liga de níquel e titânio).

⚠ **PRECAUÇÕES**

Leia atentamente todas as instruções relativas ao Sistema de exclusão de LAA AtriClip. O não cumprimento devido das instruções pode resultar no funcionamento inadequado do dispositivo.

A utilização do dispositivo deve ser limitada a pessoal médico devidamente treinado e qualificado.

Note que pedem ocorrer oscilações no ritmo cardíaco quando o coração é manipulado e/ou retirado do pericardio.

Não deixe cair nem atire o dispositivo, pois pode provocar danos no mesmo. Se deixar cair o dispositivo, não o utilize. Substitua-o por um novo.

Se a embalagem/etiqueta estiver danificada ou a barreira estéril estiver violada, descarte o dispositivo e NÃO O UTILIZE.

NÃO RESTERILIZE. O sistema de exclusão de AtriClip é fornecido ESTÉRIL e destina-se a uma ÚNICA utilização. A reesterilização pode provocar perda de função ou fornecer, no paciente.

Considere cuidadosamente qualquer tratamento pré-cirúrgico ao qual o paciente possa ter sido submetido e a correspondente velocidade de transmissão do Clip. A subtemperagem pré-cirúrgica pode resultar em alterações no dispositivo, por exemplo, fazer com que a superação da tensão do material ocorra e interrompa a aplicação para o tamanho de Clip selecionado.

Não modifique em absoluto o dispositivo, nem tentem modificação pode resultar em funcionamento inadequado do instrumento. A AtriCure, Inc. não fornece qualquer garantia nem se responsabiliza pelas características de desempenho deste produto, caso sejam efetuadas modificações ao Sistema de exclusão de LAA AtriClip.

Não tenta nem deixe ocorrer qualquer alteração a haste, uma vez que pode afetar o desempenho do dispositivo.

Prevista a ocasião de haver um ou mais Clips em uma aplicação do LAA, é uma com que aplicação de um segundo Clip cirúrgicas de oclusão do LAA. A avaliação do presença de trombos deve ser efetuada de acordo com o critério do cirurgião e norma de tratamento.

Posicione o cabeça do Clip de forma a proporcionar uma visualização adequada de todos os tecidos que tenta ser acerto. Uma fraca visualização pode resultar em oclusões de qualidade inferior e deixar tecido não oclusivo.

Tenha a cuidado de minimizar a manipulação do LAA e do Clip após a colocação do Clip.

Recomenda-se que o Clip seja colocado num campo seco.

Não utilize o Clip a temperaturas abaixo de 20 °C. A aplicação do Clip a temperaturas abaixo de 20 °C pode afetar o desempenho do dispositivo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O cirurgião deve usar o seu discernimento, em conjunto com a Guia de Seleção Gillino-Cosgrove, para determinar a tamanho de Clip a aplicar.

SELEÇÃO DO CLIP

Utilize a Guia de Seleção Gillino-Cosgrove para determinar a correta seleção de Clip de LAA Gillino-Cosgrove. O tamanho de Clip encontram-se na embalagem do dispositivo.

Tamanho do Clip	Intervalo de tamanhos de LAA (largura de LAA)
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. Utilizando uma técnica estéril, retire o Sistema de exclusão de LAA AtriClip. Verificar que o produto está intacto e não danificado.
3. A haste ergonómica do Sistema de exclusão de LAA AtriClip pode ser moldada para facilitar a acesso ao LAA. Aplique uma ligeira pressão para moldar a haste de dispositivo em função das variações anatómicas.

4. Posicione o cabeça do Clip de forma a proporcionar uma visualização adequada de todos os tecidos que tenta de acerto.
5. Enquanto o Clip estiver preso no dispositivo de colocação, avaliar se de que nenhumas estruturas circundantes interfirem com ou são danificadas pelo Clip e que o Clip é corretamente colocado.
6. Se o Clip não for colocado corretamente, abra suavemente o Clip e reposicione conforme necessário.

COLOCAÇÃO

13. Depois de o Clip estar posicionado de forma correta, solte a alavanca de atuação ou o êmbolo para permitir que o Clip se feche.
14. Coloque o Clip cartando manualmente a sutura na zona de corte indicada na alavanca ou na peça.

15. Aplicando uma pressão contrária no Clip, remova cuidadosamente a alça de colocação do LAA, como apresentado abaixo, deixando o Clip e a sutura de fixação para trás.

Cuidado: Após cortar manualmente a sutura, o Sistema de exclusão de LAA AtriClip não pode ser utilizado para reposicionar ou remover o Clip.

16. Após a colocação do Clip, remova as suturas de fixação, posando-as suavemente uma de cada vez ao mesmo tempo que aplica uma força contrária no Clip, de acordo com o critério do cirurgião. Não corte o tecido do Clip.

17. Elimine o dispositivo de colocação após a utilização. Siga as disposições regulamentares e os planos de reciclagem locais relativamente à eliminação ou reciclagem de componentes do dispositivo.

DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS

Se, por algum motivo, for necessário devolver este produto à AtriCure, Inc., terá de solicitar um número de autorização de devolução de mercadoria (ADM) à AtriCure, Inc. antes da envio.

Se o produto tiver estado em contacto com sangue ou fluídos corporais, deve ser minuciosamente limpo e desinfetado antes de ser embalado. Deve ser enviado na embalagem original ou uma semelhante, para evitar danos durante o transporte, deve ser devidamente identificado com um número ADM e ser indicada a natureza de perigo biológico do conteúdo.

Solicite instruções de limpeza e informações sobre materiais, incluindo recipientes de envio apropriados, etiquetagem adequada e um número ADM, junto da AtriCure, Inc.

DECLARAÇÕES DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Os utilizadores devem assumir a responsabilidade pela apreciação do estado aceitável deste produto antes de este ser utilizado e por assegurar que o mesmo apenas é utilizado da forma descrita nestas instruções de utilização, sem outro, assegurar que o mesmo não é reutilizado em nenhuma circunstância e a AtriCure, Inc. será responsável por qualquer perda, dano ou despesa incidental, especial ou consequencial, resultante do uso indevido ou da reutilização deliberada do produto, incluindo qualquer perda, dano ou despesa relacionada a lesões pessoais ou danos a propriedade.

INFORMAÇÕES DE MANUSEIO: CLIP LAA GILLINOV-COSGROVE

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA RM

Condições para RM

Testes não clínicos demonstraram que o Clip AD01 (dispositivo de oclusão anular) é condicional para RM. Um paciente com este dispositivo pode ser examinado em segurança num sistema de RM imediatamente após a colocação, nas seguintes condições:

- Campo magnético estático de 1,5 tesla e 3 tesla apenas;
- Campo magnético com gradiente espacial máximo de 4000 gauss/cm (40 T/m) (extrapolado) ou menos;
- Sistema de RM máximo relatado, taxa de absorção específica (SAR) média para corpo inteiro de 4 W/kg durante 15 minutos de exame (ou seja, por sequência de pulso) no modo de funcionamento controlado de primeiro nível para o sistema de RM.

Sob as condições de exame definidas para o Clip AD01, espera-se produzir um aumento máximo de temperatura de 2,9 °C após 15 minutos de exame contínuo (ou seja, por sequência de pulso).

Informações de artefato

Em testes não clínicos, o artefato se mantém cascado pelo Clip AD01 relativo a 10 mm, aproximadamente, 10 mm do Clip AD01, quando a imagem é gerada utilizando uma sequência de pulso gradiente eco e um sistema de RM de 3 T.

EXPLICAÇÃO SOBRE OS SÍMBOLOS NA ETIQUETAGEM DA EMBALAGEM

Consulte o etiquetado da embalagem exterior para ver os símbolos que se aplicam a este produto.

ro — Instrucțiuni de utilizare — ROMÂNĂ

Sistemul de excludere LAA AtriClip™ cu aparată prenclamizată Gillino-Cosgrove™

DESCIERE

Sistemul de excludere LAA AtriClip conține aparată Gillino-Cosgrove (aparată) pentru excluzia deschisă a apendicelui auricular stângi al inimii (LAA – atrial appendage). Aparata este prenclamizată și este o aparată de ună singură folosință. Sistemul de excludere LAA AtriClip cuin Gillino-Cosgrove conține și componente din cauciuc de origine naturală.

ILUSTRAȚII ȘI NOMENCLATURA DO Sistemu de excludere LAA AtriClip

LAA820, LAA840, LAA860, LAA820 — AtriClip Jaunā

1	Rāviņa	5	Formēšanas	9	Izvietošanas cilpa
2	Aktivācijas ārslēgs	6	Artikulācijas aptauja	10	Izvietošanas cilpa ar artikulāciju
3	Šauja ģeometrisa zona	7	Gillino-Cosgrove klips		
4	Pārtaisa cirsiņa ādas identifikācija	8	Šauja enkur		

AC4125, AC4140, AC4160, AC4150 – AtriClip Pastāvīgā
AC4225, AC4240, AC4260, AC4250 FLEX – AtriClip FLEX

1	Virzonis	4	Vārpsta	7	Izvietošanas cilpa
2	Rāviņa	5	Gillino-Cosgrove klips	8	Formēšanas zona 1
3	Šauja ģeometrisa zona	6	Šauja enkur		

1 Katrā AtriClip rāviņa ir atšķirīgs formējamais laukums.
Šo laukumu var izmantot, lai noteiktos apstākļos ieņemtu formēšanu.
Ierīces AtriClip standarta ierīces formējamās zonas apzīmē ar vienu kopu ar vāciņiem.
Šo formējamā zona ir atzīmēta ar vienu kopu ar vāciņiem.

⚠ **Izmantojot!** Pirms izvietošanas noņemiet un noņemiet ārējo ar vīciņi un aizvāciņu sanja vārsti nākā 3 reizes.

Ārsti Effector – attiecas uz LAA820, LAA840, LAA860 un LAA820.

2. Izaui kei AtriClip LAA-exclusieystem met het gebruik van een steriele technisch set de verpakking.
3. De buigzame schacht van het AtriClip LAA-exclusieystem laat wonden verworvel om tegoed tot het LAA te vergemakkelijken. Gelten lichte druk ait om de schacht van het apparaat te vermeen op basis van anatomische kruisies.

⚠ **Uzmanībai!** Noņemiet ietvertnes cilpu, lai saliktu vārstu, ja tai ar izraisīt ārēju bojājumu. Lietot, veikt korektnēji spēju zem ādam ādjem. Ja tas nebūtu darīts, ierīce var nedarboties vai radīsies vēlākie ādas bojājumi.

4. Izmantojot vīcuā ar aktivācijas sviru, kas atrodas uz vārsta, samaziet ar aversmi kā ādjem, lai palielinātu par pamies ādjem.

⚠ **Uzmanībai!** Pirms izvietošanas noņemiet un noņemiet ārējo ar vīciņi un aizvāciņu sanja vārsti nākā 3 reizes.

Ārsti Effector – attiecas uz LAA820, LAA840, LAA860 un LAA820.

5. AtriClip LAA izslēgšanas sistēma izvietošanas cilpu var manuāli ietvērt no 0° (ieteicamā pozīcija) līdz ± 90° attiecībā pret sānsēju, lai palīdzētu pareizi novietot Gillino-Cosgrove LAA klipu, ņemot vērā anatomiju.

Cilpas novietošana

1. Izmantojot AtriClip LAA izslēgšanas sistēmu melka dzīvdzīgie ādjem.
Vēlgi aizvert klipu, virzot aktivācijas sviru uz aizmuguri vai nospiežot vīciņu.
PIEZĪME. Klips var noņemt ārējais vāciņš, izmantojot bīdāmās forceps ceļa ādas.
Fiksēsim nobīdāsim, kad sviru ir aktivēta, un tai var atkārtoti vērt ādjem.
PIEZĪME. Klips var noņemt ārējais vāciņš, nospiežot vīciņā lūk ādjem un atsāc virzuli. Lai atbīdītu un aizvērtu klipu, pēdējā nospiežot virzuli un tādam ādjem, kāds tas ir aizvērts. Attēsu ādjem AC4125, AC4140 un AC4150.
2. Ūtentāpt klipu ievietošai ar vēpnēji ādjēdīts klipu LAA ta, lai cilpa klipu būtu vēstas vīciņai tam pretī.

3. Izmaņu novietojiet klipu LAA pamatne.

4. Šo platnīšu sari AtriClip LAA-exclusieystem kan handmatig van 0° (inline – zuals gelieverd) tot ± 90° ten opzichte van de schacht wonden gebogen om zeer juiste plaatsing van de Gillino-Cosgrove LAA-clip te ondersteunen en in te spelen op variaties in de spieren op variaties in de anatomie van de patiënt.

POSITIONERING ELEM

6. Manoeuvreer het AtriClip LAA-exclusieystem in het beoogde discstenlak.
7. Open de klem voorzichtig door de actieverpindel naar achteren te bewegen of de plunjer in te drukken.

OPMERKING: De klem kan dan in de open positie worden vergrendeld door de plunjer in te drukken tot deze vastklikt en de plunjer los te laten. U kunt de klem aangepaste en nauwkeurige plaatsing van de Gillino-Cosgrove LAA-clip ondersteunen door de plunjer voorzichtig te bewegen van AC4125, AC4140, AC4160, AC4150.

8. Ontdenner de klemgeweer met voorgeladen klem aan de part van het LAA met de lassen aan de uiteinden van de klem weg wijzend van het LAA.

AtriCure®

CE 2797

NAVODILA ZA UPORABO

Ustna velikost Sligalke za pomoč kirurgu s pomočjo modela za izbor pripomočka Gillinov-Cosgrove.

UPORABA SLIGALKE

Sledite navodilom za izbor pripomočka Gillinov-Cosgrove dobite sztrono Sligalko Gillinov-Cosgrove LAA. Velikosti Sligalk so nalepljene na ovojnino pripomočka.

Velikost Sligalke	Razpon velikosti LAA (širina LAA)
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. S sterilno tehniko uvemite sistem za izključitev LAA AtriClip iz ovojnine.
3. Glejte os sistema za izključitev AtriClip LAA lahko predoblikujte, da pomaga pri dostopu do LAA. Z rezilnim pritiskom obkrožite os pripomočka, kot narekuje razlika v anatomskih strukturah.

⚠ **Pozor:** Pri upogibanju osi ne pripravite zanke za nametitev, saj lahko tako poškodujete pripomoček. Upogibanje izvedite tako, da nežno pritisnete z obema palcema. Čemerno upogibanje ali pregibanje ali lahko vpliva na učinkovitost pripomočka. Zanke za nametitev ne poskušajte zvijati, ker lahko tako poškodujete pripomoček.

4. Z balom ali sprejšno rešeto na ročaju nežno odprite in zaprite Sligalko, da preverite pravilnost delovanja.

⚠ **Pozor:** Sligalko pred nametitvijo ne smete odpreti in zaprti z balom ali s sprejšno rešeto ali kot 3-krat.

Upogibanje končnega efektivnje – velja za LAA035, LAA040, LAA045 in LAA050.

5. Zanko za nametitev na sistemu za izključitev LAA AtriClip lahko nežno upogibate od 0° (ZIrta enojnega – dolžka, ki je ima pri dobavi do ± 90° glede na os, s čimer je pomagate pri pravilno nametitvi Sligalke za LAA Gillinov-Cosgrove, pri kateri se upošteva anatomske posebnosti bolnika.

NAMEŠČANJE SLIGALKE

6. Sistem za izključitev LAA AtriClip uzmerite v ližno dionkcijsko ravnino.
7. Sligalko odprite nežno, tako da nežno za aktivnosje premaknete nazaj ali pritisnete bat.

OPOMBA: Sligalko lahko zaklenete v odprtem položaju s funkcijo zaklepanja v ročaju pripomočka. Zaklepanje se sprosti, ko aktivirate ročico, izklopite pa ga z enakim premikom ročice v levo. Velja za LAA035, LAA040, LAA045 in LAA050.

OPOMBA: Sligalko lahko zaklenete v odprtem položaju, tako da pritisnete bat, dokler ne klikne, nato pa bat sprostite. Za ZnIrte Sligalko odklenili in zaprti, pritisnite bat do konca in ga počasi sprostite, tako da se Sligalka zapre. Velja za AC4135, AC4140, AC4145 in AC4150.

8. Aplikator Sligalke z nadzorno Sligalko uzmerite proti konci LAA tako, da so zanke na koncih Sligalke, uzmerjene ctran od LAA.

9. Sligalko nežno nametite na bazo LAA.

10. Sligalko nametite, tako da lahko jasno vizualizirate vra tkiva, do katerih dostopate.
11. Ko je Sligalka le nežno pritjrna na pripomoček za nametitev, se prepričajte, da nobena okolška struktura ne ovira Sligalke oz. je Sligalka ni poškodovana in da je Sligalka pravilno nameščena.
12. Če Sligalka ni nameščena pravilno, jo previdno odprite in prestavite, kot je potrebno.

NAMESTITEV

13. Ko je Sligalka nameščena pravilno, izpustite sprožilno ročico ali bat, ga izmer se Sligalka zapre.
14. Sligalko nametite z ročim rezanjem linaleznja materiala v nameščeni dolnožja za rezanje na nožci ali ročja.



15. Medtem ko pritiskate z nagnotni smeri na Sligalko , previdno odstranite zanke za nametitev z LAA, kot je prikazano spodaj, pri tem pa postite Sligalko in pritrdite Uvaiin material.

⚠ **Pozor:** Ko line prerežete ročno, sistema za izključitev LAA AtriClip ne morete uporabiti za prestavitev ali odstranitev Sligalke.

16. Ko je Sligalka nameščena, odstranite pritrdilne line, tako da nežno prerežete vrega za drugim, hkrati pa Sligalko vkrepite v naspotni smeri po presoji kirurga. Ne režite materiala Sligalke.

17. Pripomoček za nametitev po uporabi zavrzite. Pri odstranjevanju ali recikliranju sestavnih delov pripomočka upoštevajte kakšne predpise in sheme za recikliranje.

VRAČILO UPORABLJENEGA IZDELKA

Č ne morate to izdelek zaradi kakšnega koli razloga vrniti družbi AtriCure, Inc., morate od družbe AtriCure, Inc. pred pošiljanjem prodobiti Izvolika dovoljenja za vračilo blaga (RGA – return goods authorization).

Č je kit izdelek v eika s kroja ali notranjim tekočinami, ga morate pred pakiranjem temeljito očistiti in razkužiti. Poslati za morate v originalni škatli ali enakovredni škatli. Ga prepečite poškodbe med prevozom. Poleg tega mora biti pošiljka pravilno označena z Izvolika RGA in navedbo bolniške nevarnosti vsaktne pošiljke.

Navodila za čiščenje in razkužilo, ki ustrezajo z zahtevami zabojnika za pošiljanje, pravilno označbo in Izvolika RGA, lahko dobite pri družbi AtriCure, Inc.

IZJAVA O ZAVRNITVI ODGOVORNOSTI

Izpuščenki pricemnaja odgovornost za odobrenje upoštevnjlivega stanja tega izdelka pred njegovo uporabo in za zagotavljanje, da se izdelek uporablja samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo, med drugim za zagotavljanje, da se izdelek ne uporablja posmeno. Pod nobenim pogojem družba AtriCure, Inc. ne bo odgovorna za kakršno koli nenamerno, posredno ali posledično izgubo, škodo ali stroške, ki so posledica namerne napačne uporabe ali ponovne uporabe tega izdelka, vključno z izgubo, škodo ali stroški. A ra ponovnega i telesno prilagodbo ali materialno škodo.

PODATKI O RAVNANJU: SLIPSLKA ZA LAA GILLINOV-COSGROVE

INFORMACIJE O VARNOSTI PRI MAGNETNORESONANČNEM SLIKANJU

⚠ PRIGOJNO NARNO PRI MAGNETNO-RESONANČNEM SLIKANJU

Neklinčni tirti so pokazali, da je Sligalka AZ011 (analogni izdelek/pripomoček) pogojno varna pri magnetnoresonančnem slikanju. Bolnika s tem pripomočkom lahko varno slikate v magetnoresonančnem sistemu lahko pa nametitve pod naslednjimi pogoji:

- statično magnetno polje samo 1,5 Tesla in 3 Tesla,
- največji prostorski gradientno magnetno polje 4 000 gauss/cm (40 T/m) (ekstrapolirano) ali manj,
- najvišja vrednost posgeetne specifične hitrosti absorpcije (SAR – specific absorption rate) za celotno telo, navedena za MR-sistem, znaša 4 W/kg 15 minut slikanja (tj. za pulzno zaporedje) v načinu delovanja kontrolirnega sistema pre-stopnje.
- pri pogojih slikanja, upoštevajoč za Sligalko AD011, se pričakuje, da se bo po 15 minutah neprekinjenega slikanja (tj. po pulznem zaporedju) temperatura zvišala za največj 2,9 °C.

INFORMACIJE O ARTEFAKTIH

V neklinčnih testnnjih se pri slikanju z uporabo gradientnega odzivnega pulznega zaporedja v magnetno-resonančnem sistemu z 3 Tesla ukleoni artefakt, ki pa presega Sligalko AD011 , razširi približno 10 mm od Sligalke AD011.

OBRAZLOŽITVE SIMBOLOV NA OZNAČEVANJU NAVODIL

Preverite simbole, ki veljajo za izdelek, na zunanji ovojnini.

SF UPUTSTVO ZA UPOTREBU SRPSKI

AtriClip® LAA sistem za okluziju sa unapred postavljenim Gillinov-Cosgrove® klipom

OPIS

AtriClip LAA sistem za okluziju sadrži Gillinov-Cosgrove (LAA klip-)klip za otvorenu okluziju aurikule levе sršćme prekinutog (LAA). Klip je unapred postavljen na aplikator klipa za jednokratnu upotrebu. AtriClip LAA sistem za okluziju sa unapred postavljenim Gillinov-Cosgrove klipom se isporučuje nesterilno od lateksa od prirodne gume.

ATRICLIP LAA SISTEM ZA EKSKLUZIJU ILUSTRACIJE I NOMENKLATURA

LAA035, LAA040, LAA045, LAA050 – dugi AtriClip®

1	Ručica	5	Sastiljna osovina
2	Poluga za aktiviranje	6	Artikulacioni klipć
3	Obilazi za ocvirnje lava	7	Gillinov-Cosgrove klip
4	Konusni nastavak sa identifikatorom veličine klipa	8	Fikcatori lava

(AC4135, AC4140, AC4145, AC4150) – standardni AtriClip®
(AC4235, AC4240, AC4245, AC4250) FLEX – AtriClip FLEX®

1	Potisivač	4	Osovina
2	Ručica	5	Gillinov-Cosgrove klip
3	Obilazi za ocvirnje lava	6	Fikcatori lava
		7	Petlja za postavljanje
		8	Sastiljna osovi?

em 15.ab AtriClip handpiece has a different mallleable region.\r\n\r\nsaki nazadnik AtriClip ima drugačje področje sastiljnosti.

en The entire length of the AtriClip Long device's shaft is malleable.\r\n\r\n Celo dužina osovine sredstva dugi AtriClip je sastiljna.

en The AtriClip Standard device's malleable zone is denoted by a set of dots on the shaft near the deployment loop. It is only intended for minor adjustments in the lateral (left/right) plane.\r\n\r\nSastiljna oblast sredstva standardni AtriClip je označena nizom pregca na osovini blizu petlje za postavljanje. Sredstva su namenjena samo za manja podešavanja u bočnoj (levo/desno) ravni.

en The entire length of the AtriClip FLEX device's shaft is malleable. It is intended for adjustments up to 45° in all planes.\r\n\r\n Celo dužina osovine sredstva AtriClip FLEX je sastiljna. Namenjen je za podešavanja do 45° u svim ravninama.

⚠ OPREZ: PRE UPOTREBE PROUČIVODA DETALJNO PROČITAJTI SLEDEĆE INFORMACIJE

VAŽNO

Ova brošura je namenjena da pruži pomoć pri upotrebi ovog proizvoda. Ne predstavlja referencu za hirurške tehnike.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

AtriClip LAA sistem za okluziju indikovan je za otvorenu okluziju aurikule levе sršćme prekinutom.

KONTRAINDIKACIJE

1. Nemoguće koristiti ovaj uređaj kao kontraceptivno sredstvo za okluziju tubova.
2. Nemoguće koristiti ovo sredstvo ako pacijent ima poznatu alergiju na nitinol (legura nikla i titana).

Nema dodatnih rizika i ili neželjenih dejstava povezanih sa implantacijom klipa sa unapred postavljenim klipom.

⚠ UPOZORENJA

1. Nemoguće pokušavati da repozicioniraš ili uklониš klip nakon postavljanja. Ta može dovesti do otkinjanja ili rupanja tkiva.
2. Koristite ovo sredstvo samo u okluziju za njegovom namenom.
3. Nemoguće koristiti na tkiva koje, prema mišljenju hirурga, ne bi mogло da podnese komercionalne materijale za šavove ili komercionalne tehnike silnaoja (kao što su hirurške kopče).
4. Pre postavljanja klipa pažljivo procenite pokolaj klipa, dužinu tkiva i širinu. Za bitre odvrđivanje odgovarajuće veličine klipa, pogledajte uputstvo za upotrebu a vodiča za izbor Gillinov-Cosgrove klipa. Izbor pogrešne veličine ili pogrešno postavljanje klipa može dovesti do traume tkiva, deformacije, ongaja tkiva, poremećaj rži okluzije žrijeme hemostaze.
5. Nemoguće koristiti na aurikuli levе sršćme prekinutom koja je manja od 29 mm širine i 1,0 mm debljine zida.
6. Nemoguće koristiti na aurikuli levе sršćme prekinutom koja je veća od 50 mm kada širim nije kompromisnog.
7. Nemoguće koristiti ovo sredstvo ako je pacijent osetljiv na nikl (legura nikla i titana).

⚠ MERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Pažljivo proučiti ovo uputstvo za AtriClip LAA sistem za okluziju. Neprikladavanje uputstava može dovesti do nepravilnog rada sredstva.
2. Uputstvo sredstva treba da se ograniči na odgovarajuće obučene i kvalifikovane zdravstvene radnike.
3. Imajte u vidu da uslovi pojedinačnih tehnika mikaro i anatomije pacijenta može dovesti do rizika u određenim procedurama.
4. Vodite računa da ne bacite sredstvo jer ga sa tu kaže možete oštetiti. Nemoguće koristiti sredstvo ako ga topostite. Zamenite ga novim sredstvom.
5. Ako je sterilna pakovanje otečena ili je sterilna barijera probijena, odložite medicinska sredstva i NEMOJTE GA KORISTITI.
6. NE STERILIŠITE PONOVO. AtriClip LAA sistem za okluziju je isporučuje STERILAN i namenjen je isključivo za JEDNOKRATNU upotrebu. Višekratna sterilizacija može dovesti do gubitka funkcije sredstva ili poverde pacijenta.
7. Pažljivo razmotrite sva potencijalna lečenja kojim je pacijent podložan kao podnosnut i izabrete odgovarajući klip u skladu sa tim. Preoperativna radioterapija može dovesti do promena na tkivu. Ove promene mogu, na primer, da dovede do toga da defibrija tkiva pomalo navedeni opseg za izabranu veličinu klipa.
8. Nemoguće menjati ovaj instrument. Upotrebu izmenjenog sredstva može dovesti do nepravilne funkcije instrumenta. Kompanija AtriCure, Inc. ne daje nikakve tvrđnje niti garancije o nivo kasnijeg funkcionisanja performansi ovog proizvoda u slučaju menjanja AtriClip LAA sistema za okluziju.
9. Nemoguće vertati ili ponekomena savijati osovinu jer to može otkazati na performanse sredstva.
10. Evakuišite trombi iz aurikule levе sršćme prekinutom pre aplikacije klipa kao i kod drugih kemencionalnih hirurških tehnika okluzije aurikule levе sršćme prekinutom. Procenu prisustva tromba treba izvršiti pre nahođenja hirurga i u skladu sa standardom nege.
11. Pozicioniraje i postavite klip na način koji omogućava jasno vizualizaciju svih tkiva kojima se pristupa. Loša vizualizacija može dovesti do suboptimalnog plasiranja.
12. Potvrdite se da tkanje nakujete aurikulum levе sršćme prekinutom i klipom nakon postavljanja klipa.
13. Pregenerišje se postavljanje klipa na suvo polje.
14. Nemoguće koristiti klip na temperaturama ispod 20°C. Aplikacija klipa na temperaturama ispod 20°C može otkazati na performanse sredstva.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Veličinu klipa treba odrediti prema procesi hirurga i uz pomoć vodiča za izbor Gillinov-Cosgrove klipa.

IZBOR KLIPA

1. Koristite pricisik za izbor Gillinov-Cosgrove klipa da biste izabrali odgovarajući Gillinov-Cosgrove klip za aurikulu levе sršćme prekinutom. Veličine klipa navedene su na pakovanju sredstva.

Veličina klipa	Opseg veličine LAA (širina LAA)
35 mm	29–35 mm
40 mm	34–40 mm
45 mm	39–45 mm
50 mm	44–50 mm

2. Koristeći sterilnu tehniku uklоnite AtriClip sistem za okluziju aurikule levе sršćme prekinutom iz pakovanja.
3. Savijtiga osovinu na AtriClip LAA sistemu za okluziju može se preoblikovati da bi se pomogao pri pristupanju aurikuli levе sršćme prekinutom. Blago pritisnite kako biste obilježili osobinu sredstva prema anatomskim varijacijama.

⚠ **Oprez:** Nemojte hvatati petlju za postavljanje da biste savili osovinu jer to može dovesti do oštećenja sredstva. Blago savijte pažljivo koncentrišući silu lopod slika palca. Prekomerno savijanje ili vertanje osovine može da utiče na performanse sredstva. Nemojte pokušavati da uvijete petlju za postavljanje jer to može da dovede do oštećenja sredstva.

4. Pomoću petlakinuli ili poluge za aktiviranje na ručici pažljivo otvorite i zatvorite klip da biste obezbedili ispravno funkcionisanje.

⚠ **Oprez:** Nemojte otvarati i zatvarati klip više od 3 puta pokretanjem ili poluge za aktiviranje pre postavljanja.

Artikulacija prihvatnice sredstva – primenjuje se kod modela LAA035, LAA040, LAA045 i LAA050.

5. Petlju za postavljanje AtriClip LAA sistema za okluziju može se ručno savijati od 0° (ravno – kako je isporučuje) do ±90° u odnosu na osovinu kako bi se olakšalo pravilno postavljanje Gillinov-Cosgrove LAA klipa radi usmeranja u oblast anatomskih varijacija pacijenta.

POZICIONIRANJE KLIPA

6. Usmerite AtriClip LAA sistem za okluziju u ližnu ravan za dionkcju.
7. Pažljivo otvorite klip pomeranjem poluge za aktiviranje unazad ili pritiskom na poslednjaf.

NAPOMENA: Klip se može zaključati u otvorenom položaju pomoću funkcije zaključavanja na ručici sredstva. Brava se aktiveta aktivacijom ručice, a može se deaktivirati blagim pomeranjem poluge ulevo. Primenjuje se kod modela LAA035, LAA040, LAA045 i LAA050.

NAPOMENA: Klip se može zaključati u otvorenom položaju pritiskom na poslednjaf da svaka „klik" i ostpuštanjem poslednjaf. Da biste otključali i zatvorili klip, u potpunosti pritisnite poslednjaf i polako pustite dok se klip ne zatvori. Primenjuje se kod AC4135, AC4140, AC4145 i AC4150.

8. Orijentišite aplikator klipa sa unapred postavljenim klipom s vrh aurikule levе sršćme prekinutom tako da petlje na krajevima klipa budu usmerene dalje od aurikule levе sršćme prekinutom.

9. Pažljivo pozicionirajte klip na osnovu aurikule levе sršćme prekinutom.

10. Pozicionirajte klip na način koji omogućava jasno vizualizaciju svih tkiva kojima se pristupa.
11. Dok je klip još pričvršćen na sredstvo za postavljanje, vodite ručaca da ukažete strukture na ometajuju klip i da li klip ne obrćuje, kao i da je klip pravilno postavljen.
12. Ako klip nije pravilno postavljen, pažljivo otvorite klip i repozicionirajte ga po potrebi.

POSTAVLJANJE

13. Nakon pravilnog pozicioniranja klipa, otpustite polugu za aktiviranje ili petlakinuli kako biste omogućili klipu da se zatvori.
14. Postavite klip tako čto crte nalva pemoć (ako za osnaćenoj oblasti za setenje na pulsuć ili nožci.

15. Uz pročišćenje krvnim pritiska na klip, pažljivo uklоnite petlju za postavljanje iz aurikule levе sršćme prekinutom kao što je prikazano u nastavku, ostavljajući klip i šav za pričvršćivanje unutra.



17. Odbačte sredstvo za postavljanje nakon upotrebe. Sledite lokalne propise i planove za reciklažu, koji se odnose na odlaganje ili upad ili reciklažu komponenti sredstva.

POVRAĆAJ KOMPONENTA PROIZVODA

Ako se iz bilo kog razloga ovaj proizvod mora vratiti kompaniji AtriCure, Inc. per-claria potrebno je da dobijete broj ovlašćenja za povraćaj robe (RGA) od kompanije AtriCure, Inc.

Ako je proizvod bio u kontaktu sa krvlju ili tkivom tokosim, mora se per-pakovanje temeljno očistiti i dezinfikovati. Treba ga poslati u originalnom pakovanju ili ekvivalentnom pakovanju da bi se sprečio oštećenje tokom transporta i mora se pravilno označiti brojem RGA i oznakom za bolešćć opasan nakon pošiljke.

Uputstva za čišćenje i materijale, odgovarajući odgovarajući transporter kontejnere, odgovarajuće oznake i broj RGA, mogu se dobiti od kompanije AtriCure, Inc.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Korisnici preuzimaju odgovornost za adekvatnje pribavljanje stanja ovog proizvoda pre njegove upotrebe i za osiguravanje da se proizvod koristi samo na način navedeno u ovim uputstvima za upotrebu, uključujući, između ostalog, osiguranje da se proizvod ne koristi van pota. Kompanija AtriCure, Inc. ni pod kojim okolnostima ne snosi odgovornost za bilo koji slučajni, posredni ili posledični gubitak, štetu ili troškove koji su posledica namerne zloupotrebe ili ponovne upotrebe ovog proizvoda, uključujući bilo koji gubitak, oštećenje ili troškove koji su posledica ponovnog ili ponovnog smooive.

INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI MAGNETNOG RAZNOSA

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE U VEZI SA MR

⚠ USLOVNO BEZBEDNO ZA MR

Neklinčni testovi pokazali da je AtriClip sistem za okluziju AD011 (sredstvo za okluziju) uslovno bezbedno za MR. Pacijent sa ovim sredstvom može bezbedno da se snima pomoću MR sistema nakon nabavi plasiranja, pod sledećim uslovima:

- Statičko magnetno polje od 1,5 Tesla i 3 Tesla; uključen
- Maksimalno magnetno polje prostornog gradijenta od 4 000 gauss/cm (40 T/m) (ekstrapolirano) ili manji;
- Maksimalni specifični koeficijent apsorpcije (SAR) upravo za celo telo, pregledan za MR sistem, od 4 W/kg za 15 minuta skeniranja (tj. po sekvenci impulsa) u kontrolnom režimu prvog nivoa MR sistema
- Pod uslovima skeniranja definisanim za AD011 kip, očekuje povećanje maksimalnog povećanja temperature od 2,9°C nakon 15 minuta neprekidnog skeniranja (tj. po sekvenci impulsa).

INFORMACIJE O ARTEFAKTIMA

U neklinčnim ispitivanjima, artefakt slike uzrokovan AD011 klipom bio je približno 10 mm od AD011 klipa kada se snimi pomoću sekvence impulsa gradijentnog eha i MR sistema od 3 Tesla.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA NALEPNICAMA PRODUKATA PROIZVODA

Simboli koji se odnose na ovaj proizvod potražite na nalepnici spoljašnjeg pakovanja.

SV INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING SVENSKA

AtriClip® LAA Exclusion System med integrerad Gillinov-Cosgrove® klämma

BESKRIVNING

AtriClip LAA Exclusion System innehåller Gillinov-Cosgrove LAA-klämman (klämma) för öppen förslutning av vänster hjärtöra (LAA). Klämman är integrerad i applikatorn för engångsbruk. AtriClip LAA Exclusion System med förladdad Gillinov-Cosgrove-klämma innehåller inte komponenter av naturgummilatex.

AtriClip LAA Uteslutningssystem ILLUSTRATION OCH NOMENKLATYR

LAA035, LAA040, LAA045, LAA050 – AtriClip Long

1	Handtag	5	Formbart skaft
2	Aktiveringsspak	6	Artikulationsdel
3	Sutarkärcen	7	Gillinov–Cosgrove-klämma
4	Nästan med Kätmätarkoniellierjan	8	Fatsarskare
		9	Distributionslänga
		10	Grånad ettepynadslinje

(AC4135, AC4140, AC4145, AC4150 – AtriClip Standard®
AC4235, AC4240, AC4245, AC4250 FLEX – AtriClip FLEX®

1	Kolv	4	Axel
2	Handtag	5	Gillinov–Cosgrove-klämma
3	Sutarkärcen	6	Fatsarskare
		7	Distributionslänga
		8	Ankarbar zorl

Hälpa AtriClip handstycke har en annan formbar region.

AtriClip Long enheten har en formbar axelregion.

AtriClip Standard enheten förmåga som betecknas med en uppsättning berjpunkter som nära axeln vändpunktsregion. Den är endast avsedd för mindre justeringar i det laterala (vänster/höger) planet.

Hela längden på FLEX AtriClip enhetsaxel är formbar. Den är avsedd för justeringar upp till 45° i alla plan.

⚠ VARNING: LÄS FÖLJANDE INFORMATION NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

VIKTIGT:

Denna broschyr är utformad för att underlätta användningen av denna produkt. Det är inte en hänvisning till kirurgiska tekniker.

INDIKATION FÖR ANVÄNDNING

AtriClip LAA Exclusion System avsiedo för öppen förslutning av vänster hjärtöra.

KONTRAINDIKATIONER

1. Använd inte enheten som en förebyggande tubansäkringsenhet.
2. Använd inte denna apparat om patienten har en känd allergi mot nitinol (nickel titanlegering).

Det finns inga ytterligare risker och/eller biverkningar förknippade med implantationen av klämman, annat än de som typiskt förknippas med hjärtkirurgiska ingrepp.

⚠ VARNINGAR

1. Försök inte att flytta eller ta bort klämman efter distributionen. Detta kan resultera i vävnadsskada eller revor.
2. Använd endast den här enheten enligt anvisningarna.
3. Använd inte på vävnad som enligt kirurgen inte skulle kunna tolereva konventionella suturmaterial eller konventionella stängningstekniker (t.ex. kirurgisk häftklamp).
4. Utvärdera klämmans position noga, vävnadstjocklek och vävnadsbredd innan du använder klämman. För att bestämma lämplig klämstorlek, se bruksanvisningen för Gillinov–Cosgrove. Felaktigheter att storleksanpassa eller placera klämman kan resultera i vävnadstrauma, utslagning, bristig vävnad, förskjutning och/eller fortsatt behov av hemostas.
5. Använd inte på en LAA mindre än 29mm i bredd och 1,0 mm vägtjocklek.
6. Använd inte på en LAA större än 50mm på dilationsnivnad sätet.
7. Använd inte denna apparat om patienten har känslighet för nickel (nickel titanlegering).

⚠ FÖRSIGTHETSTRÄGARDER

1. Läs alla instruktioner noggrant för AtriClip LAA Exclusion System. Underlåtenhet att korrekt följa instruktionerna kan resultera i felaktig funktion av enheten.
2. Användning av enheten bör begränsas till korrekt utbildad och kvalificerad medicinsk personal.
3. Observera att variationer i specifika procedurer kan förekomma på grund av individuella läkarfärdigheter och patientens anatomi.
4. Tappa eller slänga inte enheten eftersom det kan orsaka skada på enheten. Om enheten tappas får den inte användas. Ersätt med en ny enhet.
5. Om den sterila förpackningen och/eller om den sterila barriären brytts, kassera apparaten och ANVÄND DEN INTE.
6. OMSTERILISERA INTE. AtriClip LAA Exclusion System tillhandahålls STERILT och är endast avsett för engångsbruk. Omsterilisering kan orsaka förlust av funktion eller skada på patienten.
7. Överväg noggrant eventuell prekirurgisk behandling som patienten kan ha genomgått och i motsvarande val av klämstorlek. Preoperativ strålbehandling kan resultera i vävnadsförändringar. Dessa ändringar kan till exempel orsaka att vävnadsprocklen överstiger det angivna intervallet för den valda klämstorleken.
8. Ändra inte detta instrument. Användning av en modifierad apparat kan resultera i felaktig instrumentfunktion. AtriCure, Inc. icke inga ansprå eller representation vad gäller produktens prestandaegenskaper om några ändringar har gjorts i AtriClip LAA Exclusion System.
9. Vrid eller böj inte axeln eftersom detta kan påverka enhetens prestanda.
10. Evakuera blodpropp från LAA innan applicering av klämman som med andra konventionella LAA sekloszamkirurgiska tekniker. Utvärdering av förekomst av blodpropp bör göras per kirurgens gottfinnande och sårdistansland.
11. Placera och distribuera klämman på ett sätt som ger adekvat visualisering av alla vävnader som används. Dålig visualisering kan resultera i suboptimal placering.
12. Var noga med att minimera manipulering av LAA och klämman efter klämdistribution.
13. Vi rekommenderar att köppet placeras i ett torrt fält.
14. Använd inte klämman i temperaturer under 20°C. Applicering av klämman i temperaturer under 20°C kan påverka enhetens prestanda.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Kirurgens bedömning, med hjälp av Gillinov–Cosgrove Selection Guide, bör avgöra vilken klämstorlek som ska tillämpas.

VAL AV KLÄMMA

1. Använd Gillinov–Cosgrove Selection Guide, för att bestämma rätt val av Gillinov–Cosgrove LAA-klämma. Klämstorlekar finns på enhetens förpackning.

Klämstorlek	LAA Storleksintervall (bredd på LAA)
35 mm	29 – 35 mm
40 mm	34 – 40 mm
45 mm	39 – 45 mm
50 mm	44 – 50 mm

2. Använd steril teknik och ta bort AtriClip LAA Exclusion System från förpackningen.
3. AtriClip LAA Exclusion System formbara schakt får omformas till stöd för att få tillgång till LAA. Applicera ett lätt tryck för att forma enhetsaxeln som krävs för anatomiska variationer.

⚠ **Varning:** Fatta inte tag i enhetens distributionslänga för att böja till axeln, eftersom detta kan resultera i skador på enheten. Böj genom att försiktigt komprimera kraften under tålda tummarna. Överdriven böjning eller vrid av axeln kan påverka enhetens prestanda. Försök inte att vrida enhetens distributionslänga, eftersom detta kan orsaka skada på enheten.

4. Använd hävern eller aktiveringsspaken på handtaget för att försiktigt öppna och stänga klämman för att säkerställa korrekt funktion.

⚠ **Varning:** Öppna och stäng inte klämman mer än 3 gånger med hävern eller aktiveringsspaken före distribution.

Artikulation av slutefektor – Gäller LAA035, LAA040, LAA045 och LAA050.

5. Distributionslänga i AtriClip LAA Exclusion System leds manuellt uppåt och nedåt och från vän till vänsta från 0° (linjär – som levereras) till ± 90° i förhållande till axeln för att stödja korrekt placering av Gillinov–Cosgrove LAA-klämman att ta hänsyn till anatomiska variationer i patientens anatomi.

PLACERING AV KLÄMMA

6. Manövrera AtriClip LAA Exclusion System till det riktade disseksionsplanet.
7. Öppna försiktigt klämman genom att flytta aktiveringsspaken bakåt eller trycka ned kolven.

OBS! Klämman kan låsas i öppet läge genom att flytta aktiveringsspaken bakåt eller trycka ned kolven. Låset kommer att aktiveras när spaken är aktiverad och kan kopplas loss genom att försiktigt trycka på spaken till vänster. Gäller LAA035, LAA040, LAA045 och LAA050.

OBS! Klämman kan låsas i öppet läge genom att trycka ned kolven tills du hörker och slutpunkt kolven. För att låsa upp och stänga klämman, tryck ned kolven helt och öppnar till klämman är stängd. Gäller AC4135, AC4140, AC4145 och AC4150.

8. Rikta klämapplikatorn med förinstallerad klämma på perten av LAA med längsaxeln i ändarna av köppet riktade bort från LAA.



9. Placera försiktigt klämman vid basen av LAA.

10. Placera klämman på ett sätt som ger tydlig visualisering av alla vävnader som används.
11. När klämman fortfarande är fäst på distributionsenheten ska du se till att inga omgivande strukturer stör eller skadas av klämman och att klämman är korrekt placerad.
12. Om klämman inte är korrekt placerad, öppna klämman försiktigt och omplacera vid behov.

DISTRIBUTION

13. När klämman har placerats på ett sätt som tillåter du köppet att stänga, släpp köppet för att stänga klämman.
14. Distribuera klämman genom att manuell klippa sutaren vid den avsedda klippzonen på spaken eller handtaget.

15. Utöva mottryck på klämman och ta försiktigt bort distributionslänggan från LAA enligt bilden nedan och efterlämna klämma och fästsutar bakom.



17. Kassera distributionsenheten efter användning. Följ lokala stryande föreskrifter och återvinningsplaner för bortskaffande eller återvinning av enhetskomponenter.

RETUR AV ANVÄND PRODUKT

Om denna produkt av någon anledning måste återlämnas till AtriCure, Inc., måste ett RGA-nummer erhållas från AtriCure, Inc., före leveransen.

Om produkten har varit i kontakt med blod eller vävnader måste den genomföras per-pakning. Den ska transporteras antingen i originalförpackningen eller i en motsvarande karlong för att förhindra skador under transporten och den bör vara korrekt märkt med ett RGA-nummer och en indikation på den biologiskt farliga karaktären hos försändelsen.

Instruktioner för rengöring och material, inklusive lämpliga transportbehållare, korrekt märkning och ett RGA-nummer kan erhållas från AtriCure, Inc.

DEKLARATION OM ANSVARSFRIHETSKRAV

Användaren har på sig ansvaret för att godkänna produktens gottgjutna tillstånd innan det används och för att säkerställa att produkten endast används på det sätt som anges i denna bruksanvisning, som bland annat att produkten inte används för ändamål som inte anges. Under inga omständigheter kommer AtriCure, Inc. att ansvara för e